



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA

REMUME IGREJINHA

2019/2020

(RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAS BÁSICOS DE IGREJINHA 2019/2020)

3ª Edição

Organizada por:
FABIANA BRIATO RASIA
REBECA ANTUNES VARGAS SCHUNCK

Igrejinha, Maio de 2019.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE

Prefeito Municipal: Joel Leandro Wilhelm

Secretária de Saúde: Realda Simone do Amaral

Médico Diretor Técnico da Secretária de Saúde: Helder Fernando dos Santos

Farmacêutica Responsável Técnica Dispensação: Fabiana Briato Rasia

Farmacêutica Responsável Técnica Manipulação: Rebeca Vargas Antunes Schunck

SIGLAS E ABREVIATURAS

AAS – Ácido Acetil Salicílico
AF – Assistência Farmacêutica
AINE – Anti-Inflamatório Não Esteroidal
ARA 2 – Antagonista dos Receptores da Angiotensina 2
AV – Atrioventricular
CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica
COX – Cicloxigenase
CNS – Conselho Nacional de Saúde
DCB – Denominação Comum Brasileira
DCI – Denominação Comum Internacional
DM – Diabete Melito
DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
ECA – Enzima Conversora da Angiotensina
ESF – Estratégias de Saúde da Família
FDA – Food and Drug Administration
G6PD – Glicose-6-fosfato desidrogenase
HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica
HCTZ – Hidroclorotiazida
IAM – Infarto agudo do miocárdio
IC – Insuficiência Cardíaca
ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva
IECA – Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina
IMAO – Inibidores da Monoaminoxidase
IR – Insuficiência Renal
IRG – Insuficiência Renal Grave
MAO – Monoaminoxidase
MS – Ministério da Saúde
PCDT – Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
REMUME 2018/2019 – Relação Municipal de medicamentos Essenciais
SNC – Sistema Nervoso Central
SES – Secretaria Estadual de Saúde
SRA – Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
SUS – Sistema Único de Saúde
TCM – Triglicérides de Cadeia Média
TGI – Trato Gastro-Intestinal
UBS – Unidades Básicas de Saúde
UI – Unidades Internacionais
VE – Ventrículo Esquerdo

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	6
INSTRUÇÕES DE USO.....	6
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS.....	7
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	7
O PROGRAMA “AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR”.....	9
COMBINAÇÕES RESTRITIVAS.....	9
CATEGORIAS DE RISCO GESTACIONAL.....	10
MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO.....	11
1. ANALGÉSICOS / ANTI-INFLAMATÓRIOS / ANTIPIRÉTICOS.....	11
1.1. Analgésicos não opioides, antitérmicos e anti-inflamatórios não esteroides.....	11
2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES.....	12
3. BRONCODILATADOR ORAL E EXPECTORANTE.....	13
4. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO.....	14
4.1 Antiasmáticos.....	14
4.2 Preparações nasais para uso tópico.....	15
5. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE GOTA.....	16
6. ANTIÁCIDOS / FUNÇÕES DIGESTIVAS E GASTRINTESTINAIS.....	16
7. ANTISECRETORES.....	17
8. ANTIEMÉTICOS E ANTIESPASMÓDICOS.....	18
9. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA.....	18
10. AGENTES ANTITROMBÓTICOS.....	19
10.1 Antagonistas da vitamina k.....	19
10.2 Inibidores da agregação plaquetária, excluindo heparina.....	19
11. ANTIBACTERIANOS.....	20
11.1 Penicilinas.....	20
11.2 Cefalosporinas.....	21
11.3 Aminoglicosídeos.....	22
11.4 Fluorquinolonas.....	22
11.5 Lincosaminas.....	22
11.6 Sulfonamídeos.....	23
11.7 Macrolídeos.....	24
11.8 Imidazólicos.....	24
11.9 Anfenicóis.....	24
11.10 Tetraciclina.....	25
12. ANTIFUNGICOS.....	25
13. ANTIVIRAIS.....	26
14. ANTIPARASITÁRIOS, ESCABICIDA E PEDICULICIDA.....	27
15. MEDICAMENTOS CONTRA TOXOPLASMOSE E MALÁRIA.....	28
16. ANTISSÉPTICOS.....	28
17. SISTEMA NERVOSO CENTRAL(SNC) E PERIFÉRICO.....	29
17.1 Antidepressivos.....	29
17.2 Anticonvulsivantes e antiepiléticos.....	30

17.3 Antipsicóticos e adjuvantes	31
17.4 Ansiolíticos e Hipnosedativos	33
17.5 Antiparkinsonianos.....	33
18. SISTEMA CARDIOVASCULAR E ANTI-HIPERTENSIVOS	34
18.1 Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio	34
18.2 Bloqueadores adrenérgicos.....	35
18.3 Agentes alfa e beta bloqueadores	36
18.4 Vasodilatadores usados em doenças cardíacas.....	36
18.5 Anti-adrenérgicos de ação central (agonista dos receptores alfa2-adrenérgicos).....	37
18.6 Inibidores da enzima conversora da angiotensina simples.....	37
18.7 Antagonistas de receptores da angiotensina	38
18.8 Antiarrítmicos classes III	38
18.9 Antiarrítmicos classes IC	39
19. DIURÉTICOS	39
20. GLICOSÍDEOS CARDÍACOS.....	40
21. REDUÇÃO DO COLESTEROL E DISTÚRBIOS CIRCULATÓRIOS.....	40
22. LAXANTES.....	41
23. SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR	42
23.1 Hormônio tireoideano e adjuvantes	42
23.2 Insulinas e antidiabéticos orais.....	42
24. HORMÔNIOS SEXUAIS, ANTAGONISTAS E OUTROS	43
24.1 Estrogênios	43
24.2 Progestógeno	44
24.3 Contraceptivos hormonais orais	44
24.4 Contraceptivos hormonais injetáveis.....	45
24.5 Contraceptivos de emergência.....	45
25.CÁLCIO, OSTEOPOROSE, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINAS, ELETÓLITOS E FERRO	46
26. RELAXANTE MUSCULAR E ANTI-INFLAMATÓRIO TÓPICO	48
27. LUBRIFICANTE OFTÁLMICO.....	48
28 .GLAUCOMA.....	48
29 .INSUMOS PARA DIABETE MELLITUS	49
30. DISPOSITIVO INTRAUTERINO	50
31. MÉTODOS DE BARREIRA	50
32. MEDICAMENTOS MANIPULADOS.....	51
32.1 Fitoterápicos de uso interno.....	51
32.2 De uso odontológico.....	53
32.3 De uso externo.....	54
33. MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS UBS E ESF	58
33.1 Padronização de diluições e materiais ambulatoriais	58
REFERÊNCIAS	63
ÍNDICE REMISSIVO.....	64

APRESENTAÇÃO

A seguir, apresentamos a 3ª edição da **RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAS BÁSICOS DE IGREJINHA – (REMUME -2019/2020)**, nesta constam os medicamentos básicos de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (**RENAME - 2018**).

A **RENAME - 2018** é uma publicação do MS com os medicamentos para combater as doenças mais comuns que atingem a população brasileira. Os Municípios do RS utilizam a RENAME vigente (2017), a Portaria GM/MS nº1.555/2013 e a Resolução N°645/13–CIB/RS, para elaborar suas listas de medicamentos Básicos para atender a assistência farmacêutica na atenção primária. Estas legislações também dispõe sobre as normas de financiamento AF no RS.

Na **REMUME -2019/2020**, escrevemos o conceito de Assistência Farmacêutica (AF) e, um resumo dos seus três componentes (Básico, Especial e Especializado), entre outros itens de interesse aos prescritores, como as **COMBINAÇÕES RESTRITIVAS** dos medicamentos anti-hipertensivos que integram o programa de **“AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR”** e a Tabela de classificação de **RISCO GESTACIONAL** segundo o **FDA**, com a finalidade de contribuir com a prescrição consciente e racional de medicamentos, para promoção da melhora da qualidade de vida da população, integrando ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos indivíduos e, facilitando seu acesso aos medicamentos essenciais.

INSTRUÇÕES DE USO

Os medicamentos da **REMUME -2019/2020** foram separados por **grupo farmacológico**, onde consta o nome genérico do medicamento, a concentração, as apresentações disponíveis na farmácia básica municipal, nomes comerciais, tipo de receituário para a prescrição, fator de risco gestacional segundo FDA, risco na lactação, grupo farmacológico, algumas contraindicações e algumas interações medicamentosas sem as respectivas justificativas (sinérgicas ou antagônicas), para os medicamentos industrializados e, para facilitar a consulta consta o índice remissivo.

Na sessão dos medicamentos **MANIPULADOS**, separamos por MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS DE USO INTERNO, MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO e MEDICAMENTOS DE USO EXTERNO, com nome, fórmula, indicação, ação, usos e algumas

observações.

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Todas as **prescrições** de medicamentos devem ter os dados completos dos pacientes, como: **nome completo, endereço residencial e telefone** e, devem ser digitadas ou ter letra clara e legível e, o carimbo com endereço da UBS. Devem ser observadas a nomenclatura oficial dos medicamentos (DCB ou DCI) e o sistema de pesos e medidas oficiais do Brasil. Na prescrição deve constar: forma farmacêutica, posologia, apresentação, via de administração e duração do tratamento, deve ter data, assinatura e carimbo do prescritor(a) com número do registro do conselho (CRM ou CRO) e, **não** devem ter rasuras ou emendas (**Importante:** as receitas digitadas em computador, mas com data escrita a caneta, são consideradas rasuras para a farmácia popular).

Deve-se observar o receituário específico para cada medicamento, por exemplo, os medicamentos **manipulados** devem ser prescritos pela fórmula em receituário **Livre ou Comum em 2 (duas) vias**, os **antibióticos** devem ser prescritos em receituário **Livre ou Comum em 2 (duas) vias**, os **medicamento controlados (Portaria 344/98)** devem ser prescritos nas receitas de **Controle especial em 2 vias (Branca controlada)**, os **benzodiazepínicos (Portaria 344/98)**, devem ser em **Notificação de Receita B (azul)** e, os demais medicamentos desta **REMUME** devem ser prescritos em receituário **Livre ou Comum**. As prescrições devem seguir as legislações: Lei Federal nº. 5.991/1973; Lei Federal nº. 9.787/1999, Resolução do CFF nº 357/2001, Resolução CFM nº 1.246/1988, Lei Estadual nº13.909/2012, etc.

Na **REMUME -2019/2020** alguns medicamentos estão identificados como:

- **é grátis na FARMÁCIA POPULAR** – para todas as apresentações dos medicamentos que são gratuitos nas farmácias com o programa **“Aqui tem Farmácia Popular”**;
- **NOVO** – para todas a novas apresentações e novos medicamentos que foram incluídos na **REMUME -2019/2020**.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A Assistência Farmacêutica (AF), é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, visando o acesso e o uso racional. Este conjunto envolve pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos, bem como a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva de resultados concretos e da melhoria da qualidade de

vida da população. (RESOLUÇÃO Nº338/2004, do Conselho Nacional de Saúde-CNS). Assistência Farmacêutica(AF) tem três componentes, descritos a seguir.

O componente Básico:

- São medicamentos e insumos da AF no **âmbito da atenção básica** em saúde e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção primária. (<http://www.saude.rs.gov.br/lista/153/Componentes>) Visto em 21/08/2015.

O componente Especial:

- Um grupo de medicamentos para o tratamento de doenças de prevalência no Estado, não contempladas nos programas de saúde do MS. Também tem uma lista de Dietas orais e enterais, Fórmulas Infantis e/ou Suplementos Nutricionais, para diversas patologias. (<http://www.saude.rs.gov.br/lista/153/Componentes>). Visto em 21/08/2015

O componente Especializado;

- É um grupo de medicamentos que visa garantir no âmbito do SUS, o acesso ao tratamento medicamentoso, de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado com alto custo unitário, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, publicados pelo MS. Definidos na Portaria GM/MS nº. 1554/13. (<http://www.saude.rs.gov.br/lista/153/Componentes>). Visto em 21/08/2015.

O financiamento do componente básico da AF é de responsabilidade das três esferas de governo (união, estados e municípios), de acordo com a legislação vigente e, a dispensação de medicamentos no SUS está definida no artigo 28 do Decreto 7508/2011, que Regulamenta a Lei nº 8080/90 e dispõe sobre a organização do SUS:

“**Art.28.** O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

- I- estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;
- II- ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;
- III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e
- IV- ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

§1º Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem.

§2º O MS poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.” (Decreto 7508/2011 - Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.6.2011). Acesso em 22/09/2015.

O PROGRAMA “AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR”

O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de oferecer mais uma alternativa de acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, e cumpre uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. O sistema informatizado do Programa “**Aqui tem Farmácia Popular**” processa como **combinação restritiva** os medicamentos com atuação semelhante ou, que não devem terapeuticamente ser associados. Considerando que a escolha do medicamento é sempre por um que melhor atende o quadro patológico do paciente e a critério do prescritor.

Porém, quando tiver **combinação restritiva** na receita, o usuário receberá apenas um dos medicamentos prescritos na **Farmácia Popular**, o outro medicamento não poderá ser liberado gratuitamente. No **quadro 1**, colocamos as principais combinações restritivas anti-hipertensivas.

Solicitamos aos prescritores da rede municipal, quando detectarem usuários com “**combinação restritiva**” para terapia anti-hipertensiva, que não tenha sido prescrita pelo cardiologista, que reavalie a terapia deste usuário e, caso não encontre alternativa terapêutica referencie este paciente ao cardiologista.

Quadro 1 – Principais Combinações Restritivas no Programa de **Farmácia Popular**.

COMBINAÇÕES RESTRITIVAS	EXEMPLOS:
Inibidores da enzima conversora da angiotensina simples com antagonistas de receptores da angiotensina 2.(IECA+ARA 2). MOTIVO: aumenta o risco de disfunção renal.	1. CAPTOPRIL 25mg+LOSARTANA 50mg 2. ENALAPRIL 10mg+LOSARTANA 50mg
Beta-bloqueadores+Inibidores da enzima conversora da angiotensina simples. MOTIVO: usados somente em coronariopatias pós IAM e portadores de disfunção sistólica VE.	1. ATENOLOL 25mg+Captopril 25mg 2. METOPROLOL + CAPTOPRIL 25mg 3. PROPRANOLOL 40mg+Captopril 25mg 4. METOPROLOL+ENALAPRIL 10mg 5. PROPRANOLOL40mg+ENALAPRIL10mg
Beta-bloqueadores+com antagonistas de receptores da angiotensina 2. MOTIVO: usados somente em coronariopatias pós IAM e portadores de disfunção sistólica VE.	1. ATENOLOL 25mg+ LOSARTANA 50mg 2. METOPROLOL + LOSARTANA 50mg 3. PROPRANOLOL 40mg+LOSARTANA 50mg
ANTI HIPERTENSIVOS DA MESMA CLASSE	USO INJUSTIFICADO.

Fonte: Arquivo pessoal da autora recebido das colegas de outro município. **OBS.:** São gratuitos pelo programa “**aqui tem Farmácia Popular**” os anti-hipertensivos ATENOLOL 25mg,

CAPTOPRIL 25mg, ENALAPRIL 10mg, LOSARTANA 50mg e PROPRANOLOL 40mg.

CATEGORIAS DE RISCO GESTACIONAL

Nesta versão da **REMUME 2018/2019**, incluímos a informação de **Categorização de Risco Gestacional (A, B, C, D, X)** que expressa o nível de risco que os fármacos representam para o feto, juntamente com as informações explicativas.

No quadro 2 abaixo, colocamos as definições para os níveis de risco usadas pela **Food and Drug Administration (FDA)**, agência reguladora dos Estados Unidos.

Quadro 2: Categorias de Teratogenicidade segundo o FDA.

CATEGORIAS	DEFINIÇÃO
A	Estudos controlados em mulheres gestantes não demonstraram risco ao feto durante o primeiro trimestre, não existindo evidência de risco em trimestres posteriores. A possibilidade de dano fetal parece remota.
B	a) Estudos em animais não demonstraram risco ao feto, mas não existem estudos controlados em mulheres gestantes. b) Estudos em animais mostraram algum efeito adverso (outro que a redução da fertilidade) que não foram confirmados em estudos controlados em gestantes no primeiro trimestre. Não há evidência de risco nos trimestres posteriores.
C	a) Estudos em animais revelaram efeitos adversos, tais como teratogenicidade e efeitos no embriocidas, mas não há estudos controlados em gestantes. b) Estudos em animais ou mulheres gestantes não estão disponíveis. c) O medicamento deve ser administrado somente nos casos em que os benefícios justificam o risco potencial ao feto.
D	Existem evidências de risco fetal, mas os benefícios devem ser analisados (p. ex.: se o medicamento é necessário em situação de risco à vida ou em doenças graves em que medicamentos seguros não podem ser usados ou não se mostraram efetivos).
X	Estudos em animais e gestantes demonstraram efeitos teratogênicos e o risco potencial supera seu possível benefício. Esses medicamentos são contraindicados para gestantes ou mulheres que desejam engravidar.

Fonte: Medicamentos na Prática da Farmácia Clínica/organizadores - 2013, pág. 1103.

Desejamos a todos um bom trabalho e, que as páginas a seguir possam auxiliar prescritores(as) da atenção básica de Igrejinha, impactando na construção de um serviço de qualidade aos usuários que procuram os serviços da Secretaria de Saúde, Farmácia, CAPS, ESFs, UBS e Hospital Bom Pastor, de acordo com boas práticas de prescrição de medicamentos, facilitando o acesso e melhorando a adesão aos tratamentos.

Atenciosamente,
Farmacêuticas: Fabiana e Rebeca.

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

1. ANALGÉSICOS / ANTI-INFLAMATÓRIOS / ANTIPIRÉTICOS

1.1. Analgésicos não opioides, antitérmicos e anti-inflamatórios não esteroides

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Ácido acetil salicílico	100mg / comprimido 500mg / comprimido <i>Obs.: Não usar em crianças e adolescentes para gripe ou catapora, sem descartar síndrome de REYE.</i>	Nome comercial: AAS, Aspirina/Acetildor Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Antiplaquetário; AINE; Inibidor da COX-1 e 2 Analgésico/ Antitérmico. Contraindicações: Discrasias sanguíneas; úlcera ativa; suspeita de dengue; gestação no 3º trimestre... Interações medicamentosas: Furosemida, inibidores da ECA, corticosteroides, inibidores da recaptação da serotonina e dos canais de cálcio....
Dipirona monoidratada	500 mg/ml Solução Oral Frasco c/10ml - gotas 500mg/comprimido	Nome comercial: Novalgina/Genérico Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C/D Lactação: Evitar amamentação até 48h após o uso. Grupo Farmacológico: Analgésico/ Antipirético Contraindicações: Deficiência de G6PD, porfíria, discrasias sanguíneas, crianças menores de 3meses ou menos de 5kg.. Interações medicamentosas: Anlodipino, propranolol, atenolol, fluoxetina, glibenclamida..
Garra-do-diabo extrato seco (<i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.) FITOTERÁPICO NOVO	Garra-do-diabo ext. seco (<i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.).....200mg Excipiente.....q.s.p. <i>*Uso restrito a duas semanas de utilização.</i> <i>*NÃO PODE SER USO CONTÍNUO.</i> <i>*Uso restrito a duas semanas de utilização.</i>	Indicações: Alívio de dores articulares moderadas e lombalgia aguda. Ação: Anti-inflamatória em osteoartrite, gota e outras condições inflamatórias. Contraindicações: Pacientes com úlceras gástricas e duodenais, cálculos e obstruções de vias biliares, intestino irritável, gravidez, lactação, usuários de anticoagulante oral e antiarrítmicos. Precauções: Administrar com cautela a pacientes com afecções cardiovasculares. Uso: 1 cápsula 1 a 2 vezes ao dia (em idosos diminuir a quantidade de vezes). <i>*É contraindicado para menores de 18 anos.</i> <i>*É contraindicado na gravidez e lactação.</i>
Ibuprofeno	300mg / comprimido 600mg / comprimido 50mg/ml/suspensão oral 30ml	Nome comercial: Alivium/Ibuvix/Ibuprotrat/Gen Receituário: Livre Gestação: Fator Risco Bº trimestre e D 3º trimestre Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: AINE, Inibidor COX-1e 2 Contraindicações: Alergia a salicilatos e iodetos, IRG, úlcera péptica ativa... Interações medicamentosas: Glibenclamida, furosemida, HCTZ, clopidogrel, fluoxetina, varfarina, atenolol, captopril, carvedilol,

Paracetamol	500mg /comprimido 200mg/ml/solução oral c/15ml	Nome comercial: Dôrico/Tylenol/ Genérico Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Analgésico /Antitérmico. Contraindicações: hipersensibilidade comp.fórmula Interações medicamentosas: cloranfenicol, carbamazepina, lamotrigina, varfarina...
Unha-de-gato extrato seco (Uncaria tomentosa D.C.) FITOTERÁPICO NOVO	Unha-de-gato extrato seco (Uncaria tomentosa D.C.).....100mg Excipiente fito.....q.s.p. <i>*Uso restrito a oito (8) semanas.</i> <i>*NÃO PODE SER USO CONTÍNUO.</i>	Indicações: Anti-inflamatório, anti-reumático. Contraindicações: Potencialização da ação de anticoagulantes, aumentando o risco de hemorragias. Pacientes que serão submetidos a transplante, devido a seu efeito imunestimulante, não devem fazer uso deste fitoterápico. Uso: 1 cápsula, 2 a 3 vezes ao dia. <i>*Utilizar por, no máximo, oito semanas.</i> <i>*É contraindicado na gravidez e lactação.</i>

2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Beclometasona, dipropionato	50mcg NASAL spray aquoso frasco c/ 200 doses (nasal) 50mcg oral c/200 doses (Pediátrico) inalatório ORAL é grátis na FARMÁCIA POPULAR 250mcg oral c/200 doses (acima de 12 anos) inalatório ORAL é grátis na FARMÁCIA POPULAR	Nome comercial: Clenil / Miflazona (inalatórios) Clenil aquoso nasal spray; Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Corticoide Contraindicações: Asma que requer medidas intensivas, hipersensibilidade a comp. da formula. Interações medicamentosas: Antidiabéticos orais e diuréticos de alça e tiazídicos. Obs: monitorar crianças no pós-parto para sinais de hipoadrenalismo se a gestante recebeu doses substanciais de beclometasona
Dexametasona	0,1% (1mg/g) c/10g CREME dermatológico 0,1% (1mg/ml) suspensão oftálmica c/ 5ml COLÍRIO	Nome comercial: Maxidex/ Corticotop/ Genérico Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Corticoide sistêmico. Contraindicações: Infecções fúngicas sistêmicas, malária cerebral, glaucoma, infecção ocular, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Interações medicamentosas: Varfarina, ibuprofeno, fluconazol, nifedipino, eritromicina, ciprofloxacino, glibenclamida, insulina....

Prednisona	5mg / comprimido 20mg / comprimido	Nome comercial: Meticorten/ Corticoten / Predcort Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: compatível Grupo Farmacológico: Corticoide sistêmico Contraindicações: Infecções sistêmicas, varicela, infecção grave (exceto choque séptico e meningite tuberculosa), uso c/vacinas de vírus vivos. Interações medicamentosas: Hidroclorotiazida, AAS, vacinas, carbamazepina, fluconazol, ciprofloxacino, varfarina, quetiapina...
Prednisolona, fosfato sódico de	1mg/ml c/ 100ml solução oral 3mg/ml c/ 60 ml/ solução oral	Nome comercial: Predsin / Prelone/ Genérico Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Corticoide sistêmico Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes fórmula, herpes superficial, infecção fúngica, varicela-zóster. Interações medicamentosas: furosemida, carbamazepina, ciprofloxacino, anticoncepcionais orais, itraconazol...

3. BRONCODILATADOR ORAL E EXPECTORANTE

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Aminofilina	100mg/ comprimido	Nome comercial: Aminofilina / Asmapen Receituário: Livre (comprimido) Gestação: Fator de Risco C Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Broncodilatador Contraindicações: Hipersensibilidade arritmias ... Interações medicamentosas: Benzodiazepínicos, albendazol, alopurinol.....
Xarope Expectorante FITOTERÁPICO MANIPULADO	Ácido cítrico anidro.....0,2% Agrião extrato fluído.....1% Tintura de própolis.....1% Guaco extrato fluído.....2% Bálsamo de Tolú.....2% Xarope simples.....q.s.p.100ml	Indicação: Acalma a tosse prolongada, proporcionando alívio da congestão pulmonar e promovendo a expectoração. Uso: 5 ou 10 mL 2 a 3 vezes ao dia.

4. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

4.1 Antiasmáticos

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Fenoterol, Bromidrato de	5mg/ml c/ 20ml / Sol. Inalatória p/ Nebulização	<p>Nome comercial: Berotec / Genérico</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Beta2-agonista curta ação, Broncodilatador.</p> <p>Contraindicações: Arritmia cardíaca+taquicardia, Cardiomiopatia, Hipertireoidismo</p> <p>Interações medicamentosas: Atenolol, Carvedilol..</p>
Ipratrópio, Brometo de	0,250mg/ml C/20ml / Solução Inalatória p/ Nebulização é grátis na FARMÁCIA POPULAR	<p>Nome comercial: Atrovent / Ipraneo / Genérico</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Usar com precaução.</p> <p>Grupo Farmacológico: Anticolinérgico Inalatório, Broncodilatador. Contraindicações: Hipersensibilidade à atropina e/ ou derivados e a lecitina de soja.</p> <p>Interações medicamentosas: atropina, hioscina..</p>
Salbutamol	<p>SPRAY ORAL Aerosol inalatório 120mcg/dose (equivalente a 100mcg/dose)</p> <p>é grátis na FARMÁCIA POPULAR</p> <p>Xarope 2mg/5ml (0,4mg/ml) frasco c/ 120ml</p>	<p>Nome comercial: Aerolin/ Aerogold / Aerojet</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Usar com precaução.</p> <p>Grupo Farmacológico: β2-agonista curta ação; Broncodilatador.</p> <p>Contraindicações: Arritmia,taquicardia/digitálicos..</p> <p>Interações medicamentosas: Digoxina, metoprolol.</p>

4.2 Preparações nasais para uso tópico

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Beclometasona, dipropionato	NASAL spray 50mcg aquoso frasco c/ 200 doses (nasal)	<p>Nome comercial: Clenil aquoso nasal spray;</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Compatível</p> <p>Grupo Farmacológico: Corticoide</p> <p>Contraindicações: Asma que requer medida intensiva, hipersensibilidade componentes fórmula.</p> <p>Interações medicamentosas: Antidiabéticos orais e diuréticos de alça e tiazídicos.</p>
Budesonida	32mcg/ dose 50mcg/dose	<p>Nome comercial: Busonid Aquoso nasal / Noex</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Usar com precaução</p> <p>Grupo Farmacológico: Corticoide.</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.</p> <p>Interações medicamentosas: amiodarona, fluconazol.</p>
Cloreto de sódio + Benzalcônio (Solução Nasal)	(0,9%+0,01%) / Solução nasal c/ 30ml e bico gotejador	<p>Nome comercial: Sorine Infantil</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: --</p> <p>Lactação: Usar com precaução</p> <p>Grupo Farmacológico: Descongestionante nasal de uso tópico, Umidificante e Fluidificante.</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco..</p> <p>Interações medicamentosas: Não existem evidências confirmando a ocorrência de interações</p>

5. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE GOTA

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Alopurinol	100mg / comprimido 300mg / comprimido	<p>Nome comercial: Lopurax / Zyloric</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Compatível</p> <p>Grupo Farmacológico: Inibidor da xantina oxidase; antigotoso.</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco</p> <p>Interações medicamentosas: antiácidos, varfarina, amoxicilina...</p>

6. ANTIÁCIDOS / FUNÇÕES DIGESTIVAS E GASTRINTESTINAIS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
<p>Alcachofra extrato seco (<i>Cynara scolymus</i> L.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Alcachofra ext. seco (<i>Cynara scolymus</i> L.).....200mg</p> <p>Excipienteq.s.p.</p>	<p>Indicação: Atua na insuficiência do fígado e rins. Favorece secreção biliar, diminui colesterol, ureia e ácido úrico. É regulador das funções digestivas.</p> <p>Ação: Diurética, aumenta o volume urinário e elimina líquidos; melhora a retenção de líquido, edemas, cistites; ajuda reduzir a hipertensão arterial, é depurativa e desintoxicante, ajudando eliminar toxinas acumuladas no organismo.</p> <p>Uso: 1-2 cápsulas ao dia.</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p>
<p>Espinheira santa extrato seco (<i>Maytenus ilicifolia</i>)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Espinheira Santa ext. seco (<i>Maytenus ilicifolia</i>).....380mg</p> <p>Excipienteq.s.p.</p> <p>*NOVA FÓRMULA</p>	<p>Indicação: Para tratar as funções gastrintestinais, É cicatrizante de úlcera sendo utilizado nas gastralgias e dores de estômago. Recomposição da flora intestinal. Elimina as toxinas dos rins e pele.</p> <p>Ação: Analgesia e cicatrizante.</p> <p>Uso: 2-3 cápsulas ao dia.</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação</p>

Hidróxido de alumínio	6% suspensão oral c/ 120ml	<p>Nome comercial: Hidrotheo/Pepsamar/HALOXIN</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Não classificado *Evitar uso prolongado</p> <p>Lactação: Não Recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antiácido mineral</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco hipercalcemia, IRG, obstrução intestinal, apendicite, inflamações intestinais..</p> <p>Interações medicamentosas: Alendronato, alopurinol, atenolol, captopril, ciprofloxacino, glibenclamida, HCTZ, calcitriol, varfarina...</p>
Hidróxido de alumínio 6% + Magnésio 4%	Suspensão oral (60 mg + 40 mg) /ml Frasco c/ 100ml	<p>Nome comercial: Hidroxil/MAGNOGEL</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Risco A (hidróxido de magnésio); hidróxido de alumínio não classificado.</p> <p>Lactação: Não Recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antiácido mineral</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade fármaco, Hipofosfatemia, Sangramento gastrintestinal ou retal não diagnosticado, Apendicite, IRgrave ..</p> <p>Interações medicamentosas: Tetraciclínas, Propranolol, Levotiroxina, Itraconazol, Digoxina, Alopurinol ...</p>

7. ANTISECRETORES

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Omeprazol	20mg / Cápsula	<p>Nome comercial: Gastrium/Losec/ OMENAX</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não Recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Inibidor da bomba de prótons (H⁺/K⁺ ATPase na superfície secretora da célula parietal).</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade à droga.</p> <p>Interações medicamentosas: Carvedilol, fenitoína, carbamazepina, fluconazol, cetoconazol ...</p>
Ranitidina	150mg/Comprimido Revestido 15mg/ml xarope c/ 120ml	<p>Nome comercial: Antak / Label/ Genérico</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Usar com Precaução</p> <p>Grupo Farmacológico: Inibidor dos receptores H₂</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade à ranitidina ou a outros antagonistas H₂, pacientes com história de porfiria aguda.</p> <p>Interações medicamentosas: Varfarina, fluconazol, ferro..</p>

8. ANTIEMÉTICOS E ANTIESPASMÓDICOS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Metoclopramida	10mg / comprimido 4mg/ml / solução oral / c/ 10ml	Nome comercial: Plasil / Eucil / NOVOSIL Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com Precaução Grupo Farmacológico: Antiemético antagonista dos receptores D2 da dopamina. Contraindicações: Obstrução gastrointestinal, perfuração/hemorragia, história de convulsões. Interações medicamentosas: Sertralina, antiparkinsonianos, ...
Ondasentrona, cloridrato	8mg/ comprimido NOVO	Nome comercial: Vonau / Nausebron Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com Precaução Grupo Farmacológico: Antiemético, agente antisserotonérgico, liga-se aos receptores 5-HT ₃ . Contraindicações: Hipersensibilidade a droga Interações medicamentosas: amiodarona, azitromicina , ciclofosfamida....
Escopolamina butilbrometo de (Hioscina)	10mg / Drágeas	Nome comercial: Buscopan/Belscopan/ COLIPAN Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com Cautela Grupo Farmacológico: Anticolinérgico; bloqueio dos receptores muscarínicos no centro do vômito e no TGI (músculo liso). Contraindicações: Glaucoma, hemorragia aguda, Íleo paralítico, tireotoxicose, insuficiência cardíaca. Interações medicamentosas: Cloreto de potássio

9. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Dexclorfeniramina	2mg/comprimido 2mg/5ml frasco c/ 100ml (solução oral ou xarope)	Nome comercial: Polaramine / Histamin Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com Precaução Grupo Farmacológico: Anti-histamínico H1; primeira geração. Contraindicações: Uso concomitante com IMAO; recém-nascidos e prematuros, hipersensibilidade a dexclorfeniramina. Interações medicamentosas: Procarbazina..

Loratadina	10mg / comprimido 1mg/ml xarope c/ 100ml	Nome comercial: Claritin/ Loralerg Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Anti-histamínico H1; segunda geração. Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco, recém-nascidos e prematuros, porfiria... Interações medicamentosas: Amiodarona....
Prometazina 25mg	50mg/ml c/2ml 25mg/comprimido NOVO	Nome comercial: Polaramine / Histamin Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com Precaução Grupo Farmacológico: Anti-histamínico H1; primeira geração. Contraindicações: Uso concomitante com IMAO; recém-nascidos e prematuros, hipersensibilidade a dexclorfeniramina. Interações medicamentosas: Procarbazina..

10. AGENTES ANTITROMBÓTICOS

10.1 Antagonistas da vitamina k

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Varfarina Sódica	5mg / comprimido	Nome comercial: Marevan / Coumadin Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Anticoagulante oral; antagonista da vitamina K (fatores II, VII, IX, X) Contraindicações: Riscos de hemorragias e discrasias sanguíneas, aborto, eclâmpsia e pré-eclâmpsia), alcoolistas, psicopatias, HAS maligna... Interações medicamentosas: Hipoglicemiantes orais, paracetamol, alopurinol, amiodarona, amitriptilina, clomipramina, Carbamazepina...

10.2 Inibidores da agregação plaquetária, excluindo heparina

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Ácido acetil salicílico	100 mg comprimido	Ver item 1.1

11. ANTIBACTERIANOS

11.1 Penicilinas

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Ampicilina	500mg / Cápsula	<p>Nome comercial: Binotal, Amplacilina...</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Usar com precaução</p> <p>Grupo Farmacológico: Penicilina</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade a fórmula</p> <p>Interações medicamentosas: Contraceptivos orais, alopurinol, omeprazol...</p>
Amoxicilina	<p>500mg / Cápsula</p> <p>50mg/ml ou 250mg/5ml pó/ suspensão oral c/ 60ml</p> <p>50mg/ml ou 250mg/5ml pó/ suspensão oral c/ 150ml</p>	<p>Nome comercial: Amoxil/Hiconcil</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Compatível</p> <p>Grupo Farmacológico: Penicilina</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade componentes da fórmula ou outras penicilinas.</p> <p>Interações medicamentosas: Alopurinol, aminoglicosídeos, varfarina, venlafaxina...</p>
Amoxicilina + clavulanato de potássio	<p>250mg + 62,5mg/5ml pó p/ suspensão oral c/75ml</p> <p>250mg + 62,5mg/5ml pó p/ suspensão oral c/100ml</p> <p>500mg+125mg / Comprimido</p>	<p>Nome comercial: Clavulin</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Usar com precaução.</p> <p>Grupo Farmacológico: Penicilina+Inibidor de beta-lactamase.</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula e outras penicilinas ou a ácido clavulânico, história de icterícia ou disfunção hepática por indução de fármacos...</p> <p>Interações medicamentosas: Contraceptivos orais</p>
Benzilpenicilina benzatina	<p>600.000 UI suspensão injetável+ diluente / frasco ampolas</p> <p>1.200.000UI suspensão injetável+ diluente / frasco ampolas</p>	<p>Nome comercial: Benzetacil</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Compatível</p> <p>Grupo Farmacológico: Penicilina</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade a penicilinas</p> <p>Interações medicamentosas: Contraceptivos orais, tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina,...</p>

Benzilpenicilina procaína+potássica	400.000UI (300.000procaína+100.000UI Potássica) / suspensão injetável + diluente / frasco- ampola.	Nome comercial: Despacilina / Penkaron Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco B Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Penicilina Contraindicações: Hipersensibilidade a penicilinas Interações medicamentosas: Tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina, contraceptivos orais...
--	---	--

11.2 Cefalosporinas

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Cefalexina	250mg/5ml pó p/ suspensão oral / c/ 60ml 250mg/5ml pó p/ suspensão oral / c/ 100ml 500mg / Cápsula / Comprimido	Nome comercial: Keflex / Primacef Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com precaução; considerada segura pela Academia Americana de Pediatria. Grupo Farmacológico: Cefalosporina 1ª geração. Contraindicações: Hipersensibilidade às cefalosporinas e às penicilinas. Interações medicamentosas: metformina, probenecida, anticoagulantes, aminoglicosídeos...
Ceftriaxona dissódica IM	500mg Frasco ampola IM c/diluente. 1G Frasco ampola IM c/ diluente. NOVO	Nome comercial: Rocefin / Triaxin / TRIAXON Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com precaução; considerada segura pela Academia Americana de Pediatria. Grupo Farmacológico: Cefalosporina 3ª geração Contraindicações: Hiperbilirrubinemia neonatal, Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Interações medicamentosas: Ringer lactato.....

11.3 Aminoglicosídeos		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Gentamicina, sulfato 0,5%	5mg/ml / solução oftálmica / frasco c/5ml.	Nome comercial: Gentamicina oculum Receituário: Comum em duas(2) vias Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução. Grupo Farmacológico: Aminoglicosídeo. Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco. Interações medicamentosas: Penicilinas, AINEs...
Neomicina sulfato+bacitracina zíncica	5mg/g+250UI/g / Pomada dermatológica c/ 10g	Nome comercial: Nebacetim Receituário: Comum em duas (2) vias Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Aminoglicosídeo Contraindicações: Sensibilidade aminoglicosídeos.. Interações medicamentosas: Diuréticos de alça, anfotericina B, Cefalosporina, ciclosporina.....
11.4 Fluorquinolonas		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Ciprofloxacino	500mg / Comprimido	Nome comercial: Cipro, Proflox, Quinoflox. Receituário: Comum em duas (2) vias Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Quinolona, Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco Interações medicamentosas: AINEs, Hypericum, metadona, metotrexato,, fenitoína,estatinas... Obs: Não tomar com produtos lácteos e com cálcio.
11.5 Lincosaminas		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Clindamicina cloridrato	300mg / cápsulas ou comprimido	Nome comercial: Dalacin C / Clindacin Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco B Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Lincosaminas Contraindicações: Colite ulcerativa, colite pseudomembranosa, enterite.. Interações medicamentosas: Eritromicina

11.6 Sulfonamídeos

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Nitrofurantoína	100mg/ Cápsula	<p>Nome comercial: Macrofantina / Nitrofen</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antisséptico Urinário</p> <p>Contraindicações: IR, recém-nascidos, gestação a termo, no trabalho de parto.</p> <p>Interações medicamentosas: Fluconazol, ác. fólico, norfloxacino. Obs.: cor da urina pode ficar marrom.</p>
Sulfadiazina	500mg / Comprimido	<p>Nome comercial: Suladrin/ SULFAZINA</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Risco C no 3º trimestre.</p> <p>Lactação: Contra-indicado</p> <p>Grupo Farmacológico: Sulfonamida</p> <p>Contraindicações: Crianças menores de 2 meses, exceto c/ toxoplasmose congênita, porfiria...</p> <p>Interações medicamentosas: Anticoncepcionais orais, penicilinas, anticoagulantes cumarínicos, hidantoínas, antidiabéticos orais, AINEs, tiazídicos.</p> <p>Obs.: Ingerir sem mastigar, entre as refeições e tomar bastante líquidos durante o dia.</p>
Sulfametoxazol+ Trimetoprima	400 mg+ 80mg / comprimido 40mg/ml+8mg/ml suspensão oral / frasco c/ 50ml	<p>Nome comercial: Bactrim, Infectrim</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Fator de Risco C (a termo risco D)</p> <p>Lactação: Contraindicado.</p> <p>Grupo Farmacológico: Sulfonamida</p> <p>Contraindicações: Porfiria, anemia megaloblástica</p> <p>Interações medicamentosas: Femprocumona, digoxina, fenitoína, enalapril, amiodarona, amitriptilina...</p>
Sulfadiazina de prata Creme	1% (10mg/g) / Creme c/ 50g Obs.: Este produto não deve ser utilizado junto com enzimas proteolíticas (colagenase, papaína....).	<p>Nome comercial: Dermazine/ Genérico</p> <p>Receituário: Comum em 2 vias</p> <p>Gestação: Risco B nos 2 primeiros trimestres.</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Sulfonamida.</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade, menores 2m</p> <p>Interações medicamentosas: Papaína, Anticoagulantes, anticonvulsivantes sulfonilureias..</p>

11.7 Macrolídeos		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Azitromicina	500mg / comprimido 40mg/ml ou 200mg/5ml pó p/ suspensão oral p/ 15ml 40mg/ml ou 200mg/5ml pó p/ suspensão oral p/ 22,5ml	Nome comercial: Astro / Azi, Clindal AZ Receituário: Comum em duas vias Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Macrolídeo. Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco. Interações medicamentosas: Amiodarona antiácidos, varfarina
Eritromicina estolato	50mg/ml (250mg/5ml) / suspensão oral frasco c/60ml	Nome comercial: Ilosone / Eritromed Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Macrolídeo. Contraindicações: Porfiria, hipersensibilidade Interações medicamentosas: Fluconazol, nifedipino, sinvastatina, loratadina, ciprofloxacino
11.8 Imidazólicos		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Metronidazol / Benzoilmetronidazol	250 mg / Comprimido 400mg / Comprimido 100mg/g Gel vaginal com aplicador c/50g 40mg/ml (200mg/5ml) / suspensão oral /frasco c/ 80ml	Nome comercial: Flagyl / Helmizol Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco B a partir do 2º trimestre Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Nitroimidazólico. Contraindicações: Gestação no 1º trimestre, dependência crônica de álcool... Interações medicamentosas: Carbamazepina, lítio, fenitoína, fenobarbital, varfarina...
11.9 Anfenicóis		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Cloranfenicol	4mg/ml / Solução oftálmica / c/10ml / uso adulto	Nome comercial: Cloranfenicol Oculum Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Anfenicol Contraindicações: Evitar em recém-nascidos e Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Interações medicamentosas: Vitamina B12, Fenitoína, Rifampicina, Citalopram, Tacrolimus.

11.10 Tetraciclina

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Doxiciclina cloridrato	100mg / Drágea ou Comprimido revestido	<p>Nome comercial: Clordox/Doxiclin/ Vibramicina Receituário: Comum em 2 vias. Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Tetraciclina Contraindicações: IH grave, crianças com \leq 8anos (retarda o crescimento ósseo e descolore os dentes). Interações medicamentosas: hidróxido alumínio, digoxina, Isotretinoína, varfarina... obs.: evitar consumir leite e derivados e antiácidos próximos do medicamento (diminui a absorção).</p>
Tetraciclina cloridrato	500mg / Cápsula	<p>Nome comercial: Multigram/ Tetrex / Tetramicin Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Tetraciclina Contraindicações: Crianças \leq a 8anos (retarda o crescimento ósseo e descoloração dos dentes). Interações medicamentosas: Isotretinoína, cálcio, anticoncepcionais, varfarina, digoxina... obs.: Evitar consumir leite e derivados e, antiácidos próximos do medicamento (diminui a absorção).</p>

12. ANTIFUNGICOS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Cetoconazol	<p>200 mg / Comprimido oral</p> <p>2% (20mg/g) c/15g/ CREME uso tópico MANIPULADO</p> <p>2%(20mg/g)c/100ml XAMPU uso externo MANIPULADO</p>	<p>Nome comercial: Candoral, Nizoral. Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Antifúngico. Contraindicações: Com de derivados do Ergot. Interações medicamentosas: Omeprazol, Isoniazida, Fenitoína, efavirenz, rifampicina, Amiodarona, Anlodipino...</p>

Fluconazol	150mg / Cápsula	Nome comercial: Candizol / Zoltec Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Antifúngico Contraindicações: Porfirias agudas e hipersensi. Interações medicamentosas: Anticoncepcionais, prednisona, amiodarona, amitriptilina, fluoxetina, anlodipino, nifedipino, varfarina, carbamazepina.
Itraconazol	100mg / Cápsula	Nome comercial: Itraspor, Sporanox, Traconal Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Antifúngico Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula e gestação Interações medicamentosas: Hidróxido de alumínio, carbamazepina, omeprazol, ranitidina, fenobarbital...
Miconazol CREME VAGINAL	2% (20mg/g) / bisnaga c/80g - CREME VAGINAL +aplicador 2% (20mg/g) Loção Tópica Creмоса c/ 30ml 20mg/g Gel oral c/40g NOVO	Nome comercial: Micozen/Daktarin gel oral Receituário: Comum em 2 vias Gestação: Não tem estudos, consultar prescritores Lactação: Não tem estudos, consultar prescritores Grupo Farmacológico: Antifúngico Contraindicações: hipersensibilidade ao fármaco.. Interações medicamentosas: astemizol, terfenadina, cisaprida, sinvastatinapimozida, Alcalóides de ergot; *Uso pediátrico acima de 6 meses
Nistatina	100.000UI/ml/ Suspensão oral c/50ml + conta-gotas 25.000UI/g / bisnaga c/60g / CREME VAGINAL + aplicador	Nome comercial: Micostatin/Micostalab Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Antifúngico Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco Interações medicamentosas: <i>Saccharomyces boulardii</i>

13. ANTIVIRAIS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Aciclovir	200mg / comprimido 50mg/g creme c/ 5 a 10g	Nome comercial: Zovirax Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Antiviral Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula Interações medicamentosas: Fenitoína, Ác. Valproico, Probenecida, zidovudina, micofenolato, tenofovir

Oseltamivir (Tamiflu)	30mg / cápsula	Nome comercial: Tamiflu Receituário: Livre ou Comum em 2 vias Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Antiviral, inibidor da neuroaminidase Contraindicações: Hipersensibilidade a fórmula Interações medicamentosas: Vacina anti-influenza
	45mg/ cápsula	
	75mg/ cápsulas	

14. ANTIPARASITÁRIOS, ESCABICIDA E PEDICULICIDA

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Albendazol	400mg/ Comprimido mastigável 40mg/ml c/10ml suspensão oral	Nome comercial: Parasin, Zentel, Zolben... Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Benzimidazol. Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Interações medicamentosas: Cimetidina, Corticóides, Dexametasona, praziquantel, teofilina.
Benzoato de benzila	Loção para corpo 15% MANIPULADO Xampu para cabelo 15% MANIPULADO	Ver itens MANIPULADO de DE USO EXTERNO
Ivermectina	6mg / comprimido	Nome comercial: Revectina/ Vermectil Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Anti-helmíntico Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco e crianças com menos de 15kg. Interações medicamentosas: Depressores do SNC e Varfarina.
Mebendazol	100mg / Comprimido 20mg/ml ou (100mg/5ml) c/30ml / suspensão oral	Nome comercial: Pantelmin/ Licor de Cacau Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Anti-helmíntico Benzimidazol Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco Interações medicamentosas: Carbamazepina, Cimetidina, fenitoína e metronidazol.

Permetrina	1 % loção capilar c/ 60 ml 5% loção corporal c/ 60ml NOVO	Nome comercial: kwell, Permenati, Nedax Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Antiparasitário Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco ou a outras piretrinas, sintéticas ou naturais. Crianças com menos de 2 meses de idade.... Interações medicamentosas: Não encontrado
------------	--	---

15.MEDICAMENTOS CONTRA TOXOPLASMOSE E MALÁRIA

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Pirimetamina	25mg / Comprimido	Nome comercial: Daraprin Receituário: Livre Gestação: Risco C no 1º trimestre Lactação: Excretada no leite materno, avaliar risco-benefício. Grupo Farmacológico: Derivado sintético da aminopirimidina, antimalárico, antiparasitário. Contraindicações: IH/IR, 1º e último trimestre de gravidez, anemia megaloblástica.... Interações medicamentosas: Sulfonamidas, ác. Fólico, anticonvulsivantes hidantoínicos... Obs.: administrar ác. folínico 5 a 10 mg/dia durante tratamento, interromper o uso se rash cutâneo, dor de garganta, palidez, púrpura e glossite.

16. ANTISSÉPTICOS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Permanganato de potássio	100 mg / Comprimidos envelope c/10 cp	Nome comercial: Permanganato de Potássio Receituário: Livre Gestação: Risco B Grupo Farmacológico: antisséptico. Contraindicações: Curativos oclusivos
Solução de Thiersch	Frasco c/ 500ml	Nome comercial: Solução de Thiersch Receituário: Livre Grupo Farmacológico: antisséptico
Clorexidine digluconato 0,12% solução bucal	0,12% solução bucal c/ 250ml MANIPULADO	Ver itens MANIPULADO de uso odontológico
Fluoreto de sódio	0,05% ou 0,2% solução c/250ml MANIPULADO	Ver itens MANIPULADO de uso odontológico

17. SISTEMA NERVOSO CENTRAL(SNC) E PERIFÉRICO

17.1 Antidepressivos

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Amitriptilina cloridrato (Tricíclicos)	25mg /Comprimido revestido	<p>Nome comercial: Amitryl, Tryptanol.</p> <p>Receituário: Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antidepressivo tricíclico;</p> <p>Contraindicações: IAM recente, glaucoma ângulo estreito, prostatismo, retenção urinária..</p> <p>Interações medicamentosas:Álcool, IMAO...</p>
Clomipramina, cloridrato	25mg / Comprimido revestido	<p>Nome comercial: Anafranil, Clo, Fenatil</p> <p>Receituário: Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antidepressivo tricíclico;</p> <p>Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco, IAM recente, glaucoma, prostatismo, íleo paralítico</p> <p>Interações medicamentosas: IMAO, Valeriana, tioridazina, carbamazepina,, fluoxetina, valproato...</p>
Fluoxetina cloridrato	20mg /Cápsula / Comprimido	<p>Nome comercial: Daforin / Prozac</p> <p>Receituário: Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Inibidor seletivo da recaptção de serotonina.</p> <p>Contraindicações: Uso de IMAO dentro de 14dias</p> <p>Interações medicamentosas: diclofenaco, metoprolol, propranolol, valeriana, cava-cava...</p>
Imipramina	25mg Drágea ou Comprimido revestido	<p>Nome comercial: Imipra, Tofranil</p> <p>Receituário:Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco D</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antidepressivo tricíclico.</p> <p>Contraindicações: IAM recente, glaucoma de ângulo estreito, bloqueio de ramo, prostatismo, íleo paralítico, IMAO...</p> <p>Interações medicamentosas: Carbamazepina, barbitúricos, ciprofloxacino, fluoxetina, sertralina..</p>

Nortriptilina cloridrato	25mg / Cápsula 75mg / Cápsula	Nome comercial: Pamelor / Nortrip Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco C Lactação: Contraindicado Grupo Farmacológico: Antidepressivo tricíclico não inibidor da MAO; Contraindicações: IAM recente, gestação, IMAO, ICC, íleo paralítico, glaucoma, convulsões... Interações medicamentosas: carbamazepina, fluconazol, haloperidol, metoclopramida, varfarina.
--------------------------	----------------------------------	---

17.2 Anticonvulsivantes e antiepiléticos

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Carbamazepina	200mg/ Comprimido 2% (20mg/ml) frasco c/ 100ml suspensão oral	Nome comercial: Tegretol / Convulsan Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco D Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Antiepilético Contraindicações: Supressão da medula, bloqueio AV, doença hepática significativa, com IMAO... Interações medicamentosas: Alopurinol, eritromicina, fluconazol , paracetamol
Fenitoína sódica	100mg/ Comprimido	Nome comercial: Epelin, Hidantal Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Antiepilético/antiarrítmico classe IB; Contraindicações: Hipersensibilidade as hidantoínas, Porfíria aguda, Bradicardia sinusal, Bloqueio sinoatrial, Bloqueio AV de graus 2 e 3, Síndrome de Stokes-Adams (uso parenteral).... Interações medicamentosas: Paracetamol, aciclovir, AAS, clorpromazina, ciprofloxacino, amiodarona, amitriptilina, metotrexato....
Fenobarbital (Barbitúrico)	100MG/ Comprimido 4% (40mg/ml) solução oral / frasco c/ 20ml	Nome comercial: Gardenal / Fenocris Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Anticonvulsivante e sedativo, Barbitúrico. Contraindicações: Porfíria, Crises de ausência, Hipersensibilidade a fenobarbital e a outros barbitúricos, Insuficiência hepática grave Insuficiência respiratória... Interações medicamentosas: Ác. Valpróico, Primidona, ác. Fólico, paracetamol...

Valproato de sódio ou Ácido Valproico	250mg (eq. 250Mg de Ác. Valproico) c/ 50 Cápsulas 500mg (576,20mg equivalente a 500Mg de Ác. Valproico) Comprimidos Revestidos Solução oral ou Xarope 288mg (eq.250Mg/5ml de Ác. Valproico)	Nome comercial: Depakene/Valpakine/Valprene/ Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco D (todos os trimestres) Lactação: Compatível com amamentação. Grupo Farmacológico: Antiepilético Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco, Doença hepática ativa, disfunção hepática significativa, ou história familiar de hepatopatias, Encefalopatia hepática ou distúrbios no ciclo da ureia não diagnosticados, Porfíria... Interações medicamentosas: Nifedipina, nimodipina podem levar à toxicidade. <i>*ANVISA alerta 14/11/16, sobre risco de anomalias congênicas com uso de valproato de sódio na gestação.</i>
---------------------------------------	---	--

17.3 Antipsicóticos e adjuvantes

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Carbonato de lítio	300mg/Comprimido	Nome comercial: Carbolitium/ Carbolim Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco D Lactação: Contraindicado Grupo Farmacológico: Modulador de humor. Contraindicações: IR e IC grave, desidratação ou depleção de sódio, arritmias ventriculares graves, Interações medicamentosas: Clorpromazina, Furosemida, haloperidol, nortriptilina, imipramina, captopril, carbamazepina, enalapril, HCTZ....
Clorpromazina	25mg / Comprimido 100mg / Comprimido 4% (40mg/ml) / Solução oral / c/ 20ml	Nome comercial: Amplictil /Longatil Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Antipsicótico típico e antiemético; antagonista dos receptores D2 dopaminérgicos. Contraindicações: Depressão medular e do SNC.. Interações medicamentosas: hidróx. Alumínio, amiodarona, fluconazol, eritromicina, fluoxetina, atenolol, captopril, metoprolol, metoclopramida, fenobarbital...

<p>Haloperidol (neuroléptico)</p>	<p>5mg / Comprimido</p> <p>2% (20mg/ml) / Solução oral / 20 ml</p> <p>Decanoato de Haloperidol 70,52mg (equivalente 50Mg de haloperidol) / Ampola – IM</p> <p>HALOPERIDOL INJETÁVEL 5MG/ML C/ 1ML- IM NOVO</p>	<p>Nome comercial: Haldol/Halo / Haldol Decanoato</p> <p>Receituário: Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antipsicótico típico; antagonista dos receptores D2 da dopamina.</p> <p>Contraindicações: Parkinson, depressão do SNC, supressão da medula, doença cardíaca ou hepática grave, glaucoma ângulo fechado.</p> <p>Interações medicamentosas: Amitriptilina, amiodarona, clorpromazina, carbamazepina, fluoxetina, levodopa, lítio, metoclopramida...</p>
<p>Levomepromazina</p>	<p>25mg Comprimidos revestidos</p>	<p>Nome comercial: Neozine, Levozine.</p> <p>Receituário: Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antipsicótico típico; antagonista dos receptores D2 da dopamina.</p> <p>Contraindicações: Depressão do SNC, doença cardiovascular grave, epilepsias, discrasias sanguíneas, convulsões e uso com IMAO.</p> <p>Interações medicamentosas: Fluoxetina, Nortriptilina, metoclopramida, levodopa...</p>
<p>Risperidona</p>	<p>2mg/ Comprimidos revestidos</p>	<p>Nome comercial: Riss, Risperdal, Viverdal</p> <p>Receituário: Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antipsicótico atípico; bloqueia receptores 5-HT2 serotonina e D2 dopamina</p> <p>Contraindicações: hipersensibilidade a risperidona, IH ou IR graves.</p> <p>Interações medicamentosas: Amitriptilina, amiodarona, <i>ginkgo-biloba</i>, itraconazol, carbamazepina, fenobarbital, valproato, lítio, levodopa, sinvastatina...</p>
<p>Tioridazina (neuroléptico)</p>	<p>25mg/Comprimidos revestidos</p>	<p>Nome comercial: Melleril / Unitidazin.</p> <p>Receituário: Especial 2vias (Branca controlada)</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Não recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antipsicótico típico; antagonista dos receptores D2 da dopamina.</p> <p>Contraindicações: Depressão do SNC, supressão da medula, discrasias sanguíneas, coma, epilepsia...</p> <p>Interações medicamentosas: Clorpromazina, amiodarona, amitriptilina, risperidona, antiácidos...</p>

17.4 Ansiolíticos e Hipnosedativos		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Clonazepan	2,5mg/ml frasco c/ 20ml NOVO	Nome comercial: Rivotril Receituário: <u>Notificação de Receita B (Azul).</u> Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Benzodiazepínico; Contraindicações: Glaucoma ângulo estreito, miastenia grave, Alzheimer... Interações medicamentosas: Clozapina, Fenitoína...
Diazepam (benzodiazepínico)	5mg / Comprimido 10mg/ml / Solução injetável - IM/IV	Nome comercial: Compaz, Calmociteno, Valium . Receituário: <u>Notificação de Receita B (Azul).</u> Gestação: Fator de Risco D Lactação: Contraindicado. Grupo Farmacológico: Benzodiazepínico; Contraindicações: Glaucoma ângulo estreito, miastenia grave, IR e IH grave. Interações medicamentosas: Digoxina, Fluoxetina, fenitoína, omeprazol.
Composto Vegetal Calmante FITOTERÁPICO MANIPULADO	Maracujá ext. seco (<i>Passiflora edulis</i>).....100mg Mulungu ext. seco (<i>Erythrina mulungu</i>). 100mg Valeriana officinalis ext. seco.....100mg	Indicado: Composto contém ervas que favorecem a indução natural do sono. Trata a insônia e reduz o stress nervoso e a ansiedade. Ação: Calmante; Uso: 1-2 cápsulas 2x ao dia. *É contraindicado na gravidez e lactação.
Valeriana ext. seco (<i>Valeriana officinalis</i> L.) FITOTERÁPICO MANIPULADO	<i>Valeriana officinalis</i> ext. Seco.....50mg Excipienteq.s.p. <i>Valeriana officinalis</i> ext. seco.....100mg Excipiente.....q.s.p.	Indicação: Em casos de tensão nervosa durante TPM, menopausa. Em síndromes motoras e espasmos musculares. Combate o estress excesso de agitação nervosa. Calmante do sistema nervoso. Ação: Sedativo e calmante. Uso: 1-2 cápsulas ao dia, ou a critério médico. *É contraindicado na gravidez e lactação.
17.5 Antiparkinsonianos		
Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Biperideno cloridrato (anticolinérgico de ação central)	2mg / Comprimido 5mg/ml (lactato) / Solução injetável /Ampolas - IM/IV	Nome comercial: Akineton / Cinetol / Parkinsol Receituário: Especial 2vias (Branca controlada) Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Anticolinérgico Contraindicações: Glaucoma agudo ... Interações medicamentosas: Antidepressivos tricíclicos, Anti-histamínicos, antiarrítmicos, Kcl...

Levodopa+Benzerazida (dopaminérgicos)	100/25mg Cápsula liberação Prolongada (Prolopa HBS)	Nome comercial: Prolopa / Prolopa HBS Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução. Grupo Farmacológico: Antiparkinsoniano Contraindicações: Glaucoma ângulo estreito, lesão maligna suspeita, história de melanoma. Interações medicamentosas: IMAO, antipsicóticos, metoclopramida, ferro, fenitoína, ..
	100/25mg comprimido simples (Prolopa BD) NOVO	
	200/50mg Comprimidos Birranhurados	

Levodopa+Carbidopa	250/25mg Comprimidos sulcados	Nome comercial: Carbidol/Parklen/Parkidopa Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução. Grupo Farmacológico: Antiparkinsoniano. Contraindicações: Glaucoma ângulo estreito, lesão maligna suspeita, melanoma. Interações medicamentosas: Antipsicóticos, IMAO, fenitoína, ferro, metoclopramida...
--------------------	--------------------------------------	--

18. SISTEMA CARDIOVASCULAR E ANTI-HIPERTENSIVOS

18.1 Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Anlodipino besilato	5mg /comprimidos 10mg /comprimidos	Nome comercial: Amlodil / Pressat Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Antagonista canais de Ca.. Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco. Interações medicamentosas: Diclofenaco, Ibuprofeno, Clopidogrel...
Nifedipina	10mg / comprimido	Nome comercial: Adalat Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado. Grupo Farmacológico: Antagonista canais de Ca.. Contraindicações: Sensibilidade ao fármaco, choque, estenose aórtica, angina, crise de porfíria Interações medicamentosas: Amiodarona Alprazolam, clopidogrel, diclofenaco, metformina...

Verapamil	80mg/ comprimido	Nome comercial: Dilacoron Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Antagonista canais de Ca Contraindicações: ICC, Doenças do nó sinusal, bloqueio AV de 2º ou 3º grau, choque cardiogênico. Interações medicamentosas: amiodarona, atenolol, carvedilol, metoprolol, itraconazol, carbamazepina, ibuprofeno, sinvastatina...
-----------	------------------	--

18.2 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Atenolol	25mg / comprimido é grátis na FARMÁCIA POPULAR 50mg / comprimido	Nome comercial: Ablok/Angipress / Atenolon Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco D Lactação: Não recomendado . Grupo Farmacológico: Beta-1 seletivo. Contraindicações: Doença nó sinusal, bloqueio AV Interações medicamentosas: Amiodarona, aminofilina, AINEs...
Metoprolol Succinato	25mg/Liberação controlada 50mg/Liberação controlada 100mg/Liberação controlada *Podem ser partidos ao meio; *não podem ser triturados ou esmagados. *Tomar com ou sem alimento	Nome comercial: Selozok / Seloken Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C no 1º trimestre e D 2º e 3º trimestres. Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Betabloqueador, beta-1 seletivo. Contraindicações: Síndrome sinusal (com uso do marcapasso), bloqueador AV de 2º e 3º grau, choque cardiogênico, hipotensão, ICC descompensada... Interações medicamentosas: Anlodipino, adrenalina, ibuprofeno, dipirona, glibenclamida, insulina, digoxina...
Metoprolol tartarato	100mg comprimidos revestidos liberação imediata. *Podem ser partidos ao meio *Tomar com alimento ou logo após *Podem ser triturados para administração via sonda	Nome comercial: Seloken Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C/D no 2º e 3º trimestres. Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Betabloqueador, beta-1 seletivo. Contraindicações: Doença do nó sinusal, bloqueio AV de 2º e 3º grau, choque cardiogênico, hipotensão, ICC descompensada, asma bronquica, dpoc... Interações medicamentosas: Anlodipino, adrenalina, ibuprofeno, dipirona, glibenclamida, insulina, digoxina...

Propranolol cloridrato *também usado para hipertensão em crianças.	40mg / comprimido é grátis na FARMÁCIA POPULAR	Nome comercial: Amprax / Inderal Receituário: Livre Gestação: Risco C 1º trimestre e D no 2º e 3º trim. Lactação: compatível. Grupo Farmacológico: Betabloqueador sem seletividade beta-1. Contraindicações: Doença do nó sinusal, bloqueio AV de 2º e 3º grau, choque cardiogênico, hipotensão, acidose metabólica, ICC descompensada, asma brônquica, DPOC... Interações medicamentosas: HCTZ, AINEs, anlodipino, varfarina, antidiabéticos orais, insulinas
---	--	---

18.3 Agentes alfa e beta bloqueadores

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Carvedilol	3,125mg, / comprimido 6,25mg / comprimido 12,5mg / comprimido 25mg / comprimido	Nome comercial: Karvil / Divelol Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C e D Lactação: Não Recomendado Grupo Farmacológico: Bloqueador dos receptores alfa e beta-adrenérgicos. Contraindicações: Choque cardiogênico, Asma, ICC sintomática, Bradicardia leve, bradiarritmias, Interações medicamentosas: Amiodarona, AINEs..

18.4 Vasodilatadores usados em doenças cardíacas

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Hidralazina	25mg / drágea NOVO	Nome comercial: Apresolina Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Vasodilatador direto Contraindicações: Doença valvar mitral reumática e hipersensibilidade a fórmula. Interações medicamentosas: Furosemida, metoprolol, propranolol, metilfenidato
Isossorbida Dinitrato 5mg (sublingual)	5mg/ comprimido sublingual	Nome comercial: Isordil Sublingual Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução. Grupo Farmacológico: Nitrato Vasodilatador venoso e coronariano. Contraindicações: Estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, hipotensão arterial. Interações medicamentosas: Sildenafil, Tadalafil

Isossorbida Dinitrato 10mg	10mg/comprimido	<p>Nome comercial: Isordil /Angil</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Usar com precaução.</p> <p>Grupo Farmacológico: Nitrato Vasodilatador venoso e coronariano.</p> <p>Contraindicações: Estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, hipotensão arterial.</p> <p>Interações medicamentosas: Sildenafil, Tadalafil</p>
Isossorbida mononitrato	20mg / comprimido 40mg / comprimido	<p>Nome comercial: Monocordil</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Usar com precaução.</p> <p>Grupo Farmacológico: Anti-anginoso, Vasodilatador venoso e coronariano.</p> <p>Contraindicações: anemia grave, trauma craniando, hemorragia cerebral, sildenafil ...</p> <p>Interações medicamentosas: Sildenafil, Tadalafil..</p>

18.5 Anti-adrenérgicos de ação central (agonista dos receptores alfa2-adrenérgicos)

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Metildopa	250mg / cápsula 500mg / cápsula	<p>Nome comercial: Aldomet, Metilvita, Venopressin</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Compatível.</p> <p>Grupo Farmacológico: Vasodilatador central, agonista dos receptores alfa2-adrenérgicos.</p> <p>Contraindicações: Parkinson, angina, história de depressão, doença hepática ativa...</p> <p>Interações medicamentosas: Amitriptilina, ferro, lítio, atenolol, carvedilol, metoprolol, propranolol...</p>

18.6 Inibidores da enzima conversora da angiotensina simples

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Captopril	25mg / comprimido é grátis na FARMÁCIA POPULAR	<p>Nome comercial: Capoten</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C 1º trimestre e D 2º e 3º.</p> <p>Lactação: Compatível.</p> <p>Grupo Farmacológico: Inibidor da ECA simples.</p> <p>Contraindicações: Estenose bilateral da artéria renal e angioedema.....</p> <p>Interações medicamentosas: Suplementos de potássio, alopurinol, AINEs....</p>

Enalapril	5mg / cápsula 10mg / cápsula é grátis na FARMÁCIA POPULAR 20mg / cápsula	Nome comercial: Pressotec/ Renitec / Enalamed. Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C no 1º trimestre e risco D no 2º e 3º trimestre. Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Inibidor da ECA- I. Contraindicações: Estenose bilateral da artéria renal e angioedema... Interações medicamentosas: Carbonato de lítio, furosemida, espironolactona, HCTZ, AINES
-----------	--	--

18.7 Antagonistas de receptores da angiotensina

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Losartana	50mg / comprimido é grátis na FARMÁCIA POPULAR	Nome comercial: Aradois / Cozaar Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C 1º trimestre e D 2º e 3º. Lactação: Não recomendado. Grupo Farmacológico: Antagonista dos receptores da angiotensina II. Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Interações medicamentosas: Amilorida, espironolactona, fluconazol, amiodarona, ibuprofeno, lítio, enalapril....

18.8 Antiarrítmicos classes III

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Amiodarona cloridrato	200mg / cápsula	Nome comercial: Ancoron / Amiron/ miodaron Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco D Lactação: Usar com precaução Grupo Farmacológico: Antiarrítmico classe III. Contraindicações: Bloqueio sinoatrial ou AV bradicardia grave, choque, hipotensão, disfunção tireoidiana e pulmonar sensibilidade ao iodo Interações medicamentosas: Azitromicina, Ciprofloxacino...

18.9 Antiarrítmicos classes IC

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Propafenona	300mg comprimido revestido	<p>Nome comercial: Ritmonorm</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Contraindicado</p> <p>Grupo Farmacológico: Antiarrítmico classe IC.</p> <p>Contraindicações: ICC, choque cardiogênico, asma, DPOC, disfunção do nó sinusal, bloqueio AV..</p> <p>Interações medicamentosas:</p>

19. DIURÉTICOS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Espironolactona	25mg / cápsula 50mg / cápsula	<p>Nome comercial: Aldactone / Diaqua</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C/D</p> <p>Lactação: Não recomendado.</p> <p>Grupo Farmacológico: Diurético poupador de potássio, antagonista da aldosterona.</p> <p>Contraindicações: Gestação, repondo potássio, IR moderada/grave, hipercalemia, doença de Addison...</p> <p>Interações medicamentosas: Captopril, losartana, ibuprofeno, varfarina, digoxina, Lítio...</p>
Furosemida	40mg / comprimido	<p>Nome comercial: Lasix / Diuremida</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Usar com precaução</p> <p>Grupo Farmacológico: Diurético de alça.</p> <p>Contraindicações: Depleção grave de sódio e volume, anúria não responsiva a diurético.</p> <p>Interações medicamentosas: Captopril, lítio, gentamicina, Dexametasona, Fenitoína, salicilatos..</p>
Hidroclorotiazida (HCTZ)	25mg / comprimido é grátis na FARMÁCIA POPULAR	<p>Nome comercial: Clorana / Hidromed</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco B</p> <p>Lactação: Usar com precaução</p> <p>Grupo Farmacológico: Diuréticos tiazídicos.</p> <p>Contraindicações: IR grave</p> <p>Interações medicamentosas: Carbamazepina, Cálcio, diclofenaco, ibuprofeno, digoxina....</p>

20. GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Digoxina	0,25mg / comprimido	<p>Nome comercial: Digoxina/Neo Digoxina Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Glicosídeo cardíaco Contraindicações: Bradicardia, bloqueio AV 2º e 3º graus, hipocalemia, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Interações medicamentosas: HCTZ, amiodarona, atenolol, carvedilol, omeprazol, levotiroxina....</p>

21. REDUÇÃO DO COLESTEROL E DISTURBIOS CIRCULATORIOS

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
<p>Alcachofra extrato seco (Cynara scolymus L.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Alcachofra ext. seco (Cynara scolymus L.).....200mg Excipienteq.s.p.</p>	<p>Indicação: Atua na insuficiência do fígado e rins. Favorece secreção biliar, diminui colesterol, ureia e ácido úrico. É regulador das funções digestivas. Ação: Diurética, aumenta o volume urinário e elimina líquidos; melhora a retenção de líquido, edemas, cistites; ajuda reduzir a hipertensão arterial, é depurativa e desintoxicante, ajudando eliminar toxinas acumuladas no organismo. Uso: 1-2 cápsulas ao dia. <i>*É contraindicado na gravidez e lactação.</i></p>
Sinvastatina	<p>10mg / cápsula</p> <p>20mg / cápsula</p> <p>40 mg / cápsula</p>	<p>Nome comercial: Clinfar /Sinvaston Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Lactação: Contraindicado. Grupo Farmacológico: Estatinas Contraindicações: Antirretrovirais, transaminases elevadas, eritromicina, cetoconazol..... Interações medicamentosas: Amiodarona, ciprofloxacino, itraconazol, levotiroxina....</p>

<p>Ginkgo biloba ext. Seco 24% (<i>Ginkgo biloba</i> L.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p><i>Ginkgo biloba</i> L. ext. Seco.....40mg Excipienteq.s.p.</p> <p><i>Ginkgo biloba</i> L. ext. Seco.....80mg Excipienteq.s.p.</p> <p><i>Ginkgo biloba</i> L. ext. Seco.....120mg Excipienteq.s.p.</p>	<p>Indicação: Para distúrbios circulatórios arteriais decorrentes da má irrigação cerebral, como vertigens, perda de memória, dificuldade de concentração, elimina zumbidos no ouvido, trata labirintite e possui propriedades anti-radicaís livres.</p> <p>Ação: Preventiva e curativa contra as agressões endógenas/exógenas, tais como fenômeno de oxidação devido a presença de radicais livres, age na prevenção do envelhecimento. A nível cerebral permite a diminuição das desordens da memória, distúrbios de atenção, diminuição da capacidade auditiva, casos de vertigem, preservando por mais tempo autonomia e qualidade de vida.</p> <p>Uso: 1 cápsula 2 vezes ao dia.</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p>
<p>Composto Vegetal Anti-Varizes</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Castanha índia ext. seco (<i>Aesculus hippocastanum</i>)100mg Rutina pó.....100mg <i>Ginkgo biloba</i> L. ext. Seco 24%80mg Excipiente.....q.s.p.</p>	<p>Indicado: Este composto contém ervas que ativam a circulação sanguínea e o retorno venoso, agindo também como vasoconstritor periférico. Modificam a permeabilidade capilar e diminuem a fragilidade dos vasos.</p> <p>Ação:</p> <p>Uso: 1-2 cápsulas 3x ao dia</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p>

22. LAXANTES

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
<p>Óleo Mineral</p>	<p>Óleo Mineral de uso interno c/ 100ml</p>	<p>Nome comercial: Nujol / Leve Lax</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Não Recomendado</p> <p>Lactação: Não Recomendado</p> <p>Grupo Farmacológico: Laxante, Lubrificante.</p> <p>Contraindicações: obstrução do TGI, náusea, vômito e dor abdominal sem causa, hernia hiatal, pacientes com colostomia ou ileostomia, apendicite, disfagia, diverticulite, colite ulcerativa...</p> <p>Interações medicamentosas: Colecalciferol, Docusato..</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p>
<p>Cáscara sagrada ext. seco (<i>Rhamnus purshiana</i> D.C.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Cáscara sagrada ext. seco (<i>Rhamnus purshiana</i> D.C.)380mg Excipienteq.s.p.</p> <p>*NOVA FÓRMULA</p>	<p>Indicação: Constipação crônica, colecistite crônica, litíase biliar.</p> <p>Ação: Laxante e antiflatulento.</p> <p>Uso: 1-2 cápsulas ao deitar.</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p> <p>*É contraindicado p/crianças menores de 12 anos</p>

23. SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR

23.1 Hormônio tireoidiano e adjuvantes

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Levotiroxina sódica	25mcg / comprimido 50mcg / comprimido 100mcg / comprimido	<p>Nome comercial: Puran T4 / Levoid</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco A</p> <p>Lactação: Compatível</p> <p>Grupo Farmacológico: Hormônio tireoidiano</p> <p>Contraindicações: Tireotoxicose, Enfarte do miocárdio recente, Angina e hipertensão não tratadas, Insuficiência suprarrenal não corrigida, Tratamento da obesidade ou emagrecimento....</p> <p>Interações medicamentosas: Hidróxido alumínio, carbamazepina fenobarbital, fenitoína, sinvastatina, digoxina, glibenclamida, varfarina...</p>

23.2 Insulinas e antidiabéticos orais

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Glibenclamida	5mg/ comprimido é grátis na FARMÁCIA POPULAR	<p>Nome comercial: Daonil / Gliconil</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: Usar com precaução.</p> <p>Grupo Farmacológico: Sulfonilureias.</p> <p>Contraindicações: Infecções, cirurgias, infarto, DM tipo1, IH ou IR graves, cetoacidose diabética...</p> <p>Interações medicamentosas: AINEs, atenolol, Cloranfenicol,captopril,carvedilol,HCTZ,fluoxetina</p>
Gliclazida	30mg/ comprimido liberação prolongada NOVO	<p>Nome comercial: Azukon MR, Diamicon MR</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Contraindicado</p> <p>Lactação: Contraindicado</p> <p>Grupo Farmacológico: Sulfonilureia.</p> <p>Contraindicações: DM tipo 1, insuficiência hepática ou renal, cetoacidose diabética..</p> <p>Interações medicamentosas: Cloranfenicol, atenolol, captopril, carvedilol, ciprofloxacino, propranolol.</p>

Metformina cloridrato	500mg / comprimido <i>é grátis na</i> FARMÁCIA POPULAR 850 mg / comprimido <i>é grátis na</i> FARMÁCIA POPULAR	Nome comercial: Glifage Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: Não recomendado Grupo Farmacológico: Biguanidas. Contraindicações: IR, insuficiência hepatocelular, alcoolismo, cetoacidose, acidose láctica.. Interações medicamentosas: Atenolol, cefalexina, digoxina, levotiroxina, carvedilol, ciprofloxacino...
Insulina Humana NPH 100 (N)	100UI/ Suspensão injetável /10ml <i>é grátis na</i> FARMÁCIA POPULAR	Nome comercial: HUMULIN N / NOVOLIN N Receituário: livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: compatível Grupo Farmacológico: Hormônio pancreático Contraindicações: Hipoglicemia Interações medicamentosas: IMAO, fluoxetina, atenolol, lítio, ciprofloxacino, levotiroxina....
Insulina Humana (R) Regular	100 UI/ DNA recombinante / Solução injetável c/ 10ml <i>é grátis na</i> FARMÁCIA POPULAR	Nome comercial: HUMULIN R / NOVOLIN R Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco B Lactação: compatível Grupo Farmacológico: Hormônio pancreático Contraindicações: Hipoglicemia Interações medicamentosas: IMAO, <i>Ginkgo-biloba</i> , atenolol, fluoxetina, lítio, levotiroxina....

24. HORMÔNIOS SEXUAIS, ANTAGONISTAS E OUTROS

24.1 Estrogênios

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Estriol Creme (uso vaginal)	1mg/g / bisnaga Creme vaginal + aplicador	Nome comercial: Ovestrion Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Lactação: Contraindicado. Grupo Farmacológico: Estrogênios semissintéticos e naturais. Contraindicações: Homens, trombose, tumores estrogênio-dependentes, sangramento vaginal sem diagnóstico, Hiperplasia endometrial não tratada ... interações medicamentosas: Anticoncepcionais orais, corticosteroides, barbitúricos, hidantoínas....

Estrogênios conjugados naturais	0,625mg / drágea (Via Oral) 0,625mg/g bisnaga c/ 26g/ Creme vaginal + aplicador (uso vaginal)	Nome comercial: Premarim Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Lactação: Contraindicado. Grupo Farmacológico: estrogênios conjugados naturais. Contraindicações: Câncer da mama, Neoplasia estrogênio-dependente, Gravidez, Sangramento genital anormal, Distúrbios trombofílicos Interações medicamentosas: carbamazepina, Hypericum,, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, dexametasona, eritromicina e cetoconazol...
Isoflavona extrato seco 40% (<i>Glycine max</i> L. Merr) FITOTERÁPICO MANIPULADO	Isoflavonas (<i>Glycine max</i> L. Merr)..... 40mg <i>Excipiente</i>q.s.p. Isoflavonas(<i>Glycine max</i> L. Merr)..... 60mg <i>Excipiente</i>q.s.p. Isoflavonas(<i>Glycine max</i> L. Merr)..... 75mg <i>Excipiente</i>q.s.p. *NOVA FÓRMULA Isoflavonas(<i>Glycine max</i> L. Merr)..... 150mg <i>Excipiente</i>q.s.p. *NOVA FÓRMULA	Indicação: Repositor natural de hormônios na menopausa a isoflavona evita o desconforto dos calores e excesso de irritação. Ação: Cardioprotetora e melhora a absorção do cálcio. Uso: Tomar 1-2 cápsulas ao dia. Nome comercial: Soyfemme

24.2 Progestógeno

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Medroxiprogesterona acetato. (Via Oral)	10mg / comprimido	Nome comercial: Farlutal / Provera Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Contraindicações: Tumores malignos disfunção hepática, hemorragias, abortos, hemorragias geniturinárias não diagnosticadas. interações medicamentosas: Fenitoína, carbamazepina, hypéricum, varfarina...

24.3 Contraceptivos hormonais orais

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Etinilestradiol + levonorgestrel (Via Oral)	0,03mg+0,15mg / Comprimido ou drágea	Nome comercial: Ciclo 21 / Microvlar Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Contraindicações: Tromboembolismo, Arritmias, valvopatias, HAS, doença cardíaca, lúpus, porfíria.. interações medicamentosas: Amoxicilina, tetraciclina, Carbamazepina, anti-retrovirais..

Noretisterona (Via Oral)	0,35mg / comprimido	Nome comercial: Norestin / Micronor Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Contraindicações: Doença hepática aguda, tumores benignos ou malignos, carcinoma de mama, sangramento vaginal anormal... interações medicamentosas: Carbamazepina, fenitoína, alguns anti-retrovirais, oxcarbamazepina.
-----------------------------	---------------------	--

24.4 Contraceptivos hormonais injetáveis

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Medroxiprogesterona acetato (IM)	150mg/ml/Suspensão injetável Contracept / Depo-Provera / Demedrox	Nome comercial: Contracept/Depo-Provera/ Demedrox Receituário: Livre Contraindicações: Tumores malignos disfunção hepática, porfíria, hemorragias, histórico de abortos, hemorragias geniturinárias não diagnosticadas. Interações medicamentosas: Fenitoína, carbamazepina, hypéricum, varfarina...
Enantato de noretisterona+valerato de estradiol (IM)	50+5mg/ml Solução injetável (Mesigyna / Noregyna)	Nome comercial: Mesygina Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Contraindicações: Tumores hepáticos malignos ou benignos, doenças hepáticas, porfíria, tumores de mama, neoplasia estrógeno dependentes hemorragias vaginal não-diagnosticadas. ... interações medicamentosas: Não foram encontrados relatos de interações específicas.

24.5 Contraceptivos de emergência

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Levonorgestrel (Via Oral)	0,75mg / Comprimido / c/ 2cp (pílula do dia seguinte)	Nome comercial: Dopo Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco X Contraindicações: Sangramento genital sem diagnóstico, hipersensibilidade ao fármaco, interações medicamentosas: Fosfenitoína, tacrina.

25.CÁLCIO, OSTEOPOROSE, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINAS, ELETÓLITOS E FERRO

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Ácido fólico	5mg/ comprimido 0,2mg/ml c/30ml NOVO OBS.: Ác. Fólico e Ác. Folinico NÃO são sinônimos e NÃO são intercambiáveis.	Nome comercial: Endofolin; Folacin; Folin. Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco A. Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Micronutriente. Contraindicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Interações medicamentosas: Fenitoína, Fenobarbital, metotrexato, primidona, nitrofurantoína....
Alendronato de Sódio 70mg	70mg / Comprimido	Nome comercial: Alendil, Endrostan, Osteofar Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: usar com precaução Grupo Farmacológico: Bifosfonato. Contraindicações: Hipocalcemia, deficiência de vit. D e doença renal DCE < 35mL/min. Interações medicamentosas: Álcool, antiácidos, ferro, magnésio, aminoglicosídeos e Ác. Salicílico..
Carbonato de cálcio	500mg / cápsula de carbonato de cálcio.	Nome comercial: Carbonato de cálcio Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: não classificado Grupo Farmacológico: Eletrólito Contraindicações: Hipercalcemia, DRC não deve ser associado vit. D, hiperparatireoidismo primário Interações medicamentosas: ciprofloxacino, captopril, digoxina, itraconazol, propranolol,
Carbonato de cálcio Elementar	Equivalente a 500Mg de cálcio elementar (1250mg de cálcio equivalente a 500mg de Calcio elemento. NOVO)	Nome comercial: Carbonato de cálcio Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: não classificado Grupo Farmacológico: Eletrólito Contraindicações: DRC não deve associar a vit. D. Interações medicamentosas: ciprofloxacino, captopril, digoxina, itraconazol, propranolol,
Carbonato cálcio+Vit. D (500+D400).	Comprimido de 1250mg de cálcio+vitamina D 400 (equivalente à 500Mg de cálcio elementar + Vitamina D ₃ 400UI).	Nome comercial: Osteofix / Oscal / Calsan Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Usar com precaução. Grupo Farmacológico: Eletrólito Contraindicações: DRC não associar a vit. D Interações medicamentosas: Ciprofloxacino, captopril, propranolol, itraconazol, digoxina....

Sais para reidratação oral	<p>Sachê c/ 27,9g fórmula p/ preparo de um 01 litro.</p> <p>cloreto de sódio3,5g cloreto de potássio..... 1,5g citrato de sódio di-hidratado.....2,9g glicose20g</p>	<p>Nome comercial: Prati-sal Receituário: Livre Indicação: reposição de perdas acumuladas de águas e eletrólitos (reidratação), tratamento de diarreia aguda.. Contraindicações: Íleo paralítico, em obstrução ou perfuração intestinal, e nos vômitos incoerentes... Interações medicamentosas: Não apresenta. Obs.: Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.</p>
Sulfato ferroso (Fe ²⁺)	<p>Comp. revestidos 109 mg equivalente a 40 Ferro elementar)</p> <p>Solução oral 125mg/ml (equivalente a 25mg/ml de Ferro Elementar)</p>	<p>Nome comercial: Hematofer / Sulferbel Receituário:Livre Gestação: Fator de Risco A sob prescrição médica ou odontológica. Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Eletrólito. Antianêmico. Contraindicações: Anemia não causada por deficiência de ferro, pacientes recebendo repetidas transfusões de sangue, tratamento com ferro parenteral, Hemocromatose, hemossiderose,... Interações medicamentosas: Hidróxido alumínio e magnésio, cloranfenicol, levodopa, quinolonas.</p>
Vitamina A+D (Palmitato de Retinol)	<p>Vitamina A 50.000UI/ML +Vitamina D 10.000U.I/ML solução oral, frasco goteador C/ 10 ML.</p> <p>NOVO *administrar com alimento rico em gordura ou leite</p>	<p>Nome comercial: AD-TIL Receituário:Livre Gestação: Fator de Risco D Lactação: Somente com orientação médica Grupo Farmacológico:Micronutriente Contraindicações: pacientes c/ hipercalcemia e hipervitaminoses A e D, portadores de osteodistrofia renal com hiperfosfatemia, hipersensibilidade à vitamina A, colecalciferol, ergocalciferol ou metabólitos da vitamina D Interações medicamentosas: Vitamina A, Vitamina D, antiácidos com magnésio, isotretinoína...</p>
Cianocobalamina (vitamina B12)	<p>500mcg/ml c/2ml (1000mcg) Ampola. IM</p> <p>NOVO</p>	<p>Nome comercial: Amicored/Rubranova/ Cronobe Receituário:Livre Gestação: Fator de Risco C Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Micronutriente Contraindicações: Hipersensibilidade à fórmula Interações medicamentosas:Cloranfenicol, vit C, Colchicina, omeprazol ..</p>
Piridoxina cloridrato (Vitamina B6)	<p>40mg comprimido</p> <p>NOVO</p>	<p>Nome comercial: Neuri B6 Receituário:Livre Gestação: Fator de Risco A (C se ultrapassar as recomendações da RDA) Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Micronutriente Contraindicações: Hipersensibilidade à fórmula Interações medicamentosas: Levodopa, fenitoína,..</p>

Tiamina (vitamina B1)	300mgcomprimido revestido NOVO	Nome comercial: Benerva, Beum, Nervamin Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco A (C se ultrapassar as recomendações da RDA) Lactação: Compatível Grupo Farmacológico: Micronutriente Contraindicações: Hipersensibilidade à fórmula Interações medicamentosas: Literatura indisponível
-----------------------	--	--

26. RELAXANTE MUSCULAR E ANTI-INFLAMATÓRIO TÓPICO

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Creme Dor articular / muscular	Analgésico e relaxante muscular	Ver itens MANIPULADO de USO EXTERNO
Gel de Arnica e Diclofenaco	Anti-inflamatório, analgésico e relaxante muscular	Ver itens MANIPULADO de USO EXTERNO
Gel de Arnica e Calêndula	Analgésico e relaxante muscular	Ver itens MANIPULADO de USO EXTERNO

27. LUBRIFICANTE OFTÁLMICO

Denominação genérica	Concentração/ apresentação	OBSERVAÇÃO
Hipromelose 0,5%	Colírio 0,5% c/ 5ml	Nome comercial: Filmcel Receituário: Livre Gestação: não classificado Lactação: não classificado Indicações: Substituto de lágrima, ceratoconjuntivite seca, ceratite, lubrificante de lentes de contato... Contraindicações: Hipersensibilidade a hipromelose Interações medicamentosas:

28 .GLAUCOMA

Denominação	Apresentação	OBSERVAÇÃO
Acetazolamida	250mg / comprimido NOVO	Nome comercial: DIAMOX Receituário: Livre Gestação: Fator de Risco Lactação: Grupo Farmacológico: Diurético; inibidor da enzima anidrase carbônica. Contraindicações: Hepatopatia grave, insuficiência adrenal e renal... Interações medicamentosas: Salicilatos, ciclosporina e sotalol, Fenitoína, topiramato

Timolol, maleato 0,5%	Colírio 0,5% c/ 5 ml	<p>Nome comercial: Timolol</p> <p>Receituário: Livre</p> <p>Gestação: Fator de Risco C</p> <p>Lactação: não classificado</p> <p>Grupo farmacológico: bloqueador não seletivo dos receptores b-adrenérgicos...</p> <p>Indicações: Hipertensão ocular, Glaucoma crônico de ângulo aberto....</p> <p>Contraindicações: ICC não controlada, Choque cardiogênico, Bradicardia sinusal grave, Bloqueio cardíaco, Asma ou doença obstrutiva vias aéreas..</p> <p>Interações medicamentosas: Agonistas beta-2 adrenérgicos, Antidiabéticos, Clonidina,...</p>
-----------------------	----------------------	---

29 .INSUMOS PARA DIABETE MELLITUS

Denominação	Apresentação	OBSERVAÇÃO
Seringa p/ insulina c/ agulha acoplada	Seringa 100 UI	Seringa 100UN (1ml) c/agulha 8x30mm escala de 2 em 2 unidades.
Seringas para insulina 50CC c/agulha	Seringa 50UI	Seringa 50UN (1ml) c/agulha 8x30mm escala de 1 em 1 unidades
Lancetas	Punção digital p/ HGT	Descartável
Fitas (tiras reagentes) p/ HGT	Caixa com 50 fitas e um chip.	Fitas reativas para verificação de HGT
Glicosímetro digital	Unidade	Dispensado com prescrição médica, com a posologia e laudo com CID.

30. DISPOSITIVO INTRAUTERINO

Denominação genérica	Apresentação	OBSERVAÇÃO
Dispositivo intra-uterino plástico c/ cobre	DIU de cobre	MODELO T 380 mm ² (OPTIMA DIU Tcu 380A)
Diafragma		

31. MÉTODOS DE BARREIRA

Denominação genérica	Apresentação	OBSERVAÇÃO
Preservativos masculinos	170mm X 49mm e 180mm X 52mm	
Preservativos femininos		

32. MEDICAMENTOS MANIPULADOS

32.1 Fitoterápicos de uso interno

Descrição	Fórmula	Indicação/Ação/ Uso
<p>Alcachofra extrato seco (<i>Cynara scolymus</i> L.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Alcachofra ext. seco (<i>Cynara scolymus</i> L.).....200mg</p> <p>Excipienteq.s.p.</p>	<p>Indicação: Atua na insuficiência do fígado e rins. Favorece a secreção biliar, diminui o colesterol, a ureia e o ácido úrico. É regulador das funções digestivas.</p> <p>Ação: Diurética, aumenta o volume urinário e elimina líquidos; melhora a retenção de líquido, edemas, cistites; ajuda reduzir a hipertensão arterial, é depurativa e desintoxicante, ajudando eliminar toxinas acumuladas no organismo.</p> <p>Uso: 1-2 cápsulas ao dia.</p> <p><i>*É contraindicado na gravidez e lactação.</i></p>
<p>Cáscara sagrada ext. seco (<i>Rhamnus purshiana</i> D.C.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Cáscara sagrada ext. seco (<i>Rhamnus purshiana</i> D.C.)380mg</p> <p>Excipienteq.s.p.</p> <p>*NOVA FÓRMULA</p>	<p>Indicação: Constipação crônica, colecistite crônica, litíase biliar.</p> <p>Ação: Laxante e antiflatulento.</p> <p>Uso: 1-2 cápsulas ao deitar.</p> <p><i>*É contraindicado na gravidez e lactação.</i></p> <p><i>*É contraindicado p/crianças menores de 12 anos</i></p>
<p>Espinheira santa extrato seco (<i>Maytenus ilicifolia</i>)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Espinheira Santa ext. seco (<i>Maytenus ilicifolia</i>).....380mg</p> <p>Excipienteq.s.p.</p> <p>*NOVA FÓRMULA</p>	<p>Indicação: Para tratar as funções gastrintestinais. É cicatrizante de úlcera sendo utilizado nas gastralgias e dores de estômago. Recomposição da flora intestinal. Elimina as toxinas dos rins e pele.</p> <p>Ação: Analgésica e cicatrizante.</p> <p>Uso: 2-3 cápsulas ao dia.</p> <p><i>*É contraindicado na gravidez e lactação</i></p>
<p>Garra-do-diabo extrato seco (<i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p> <p>NOVO</p>	<p>Garra-do-diabo ext. seco (<i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.).....200mg</p> <p>Excipiente.....q.s.p.</p> <p><i>*Uso restrito a duas semanas de utilização.</i></p> <p>*NÃO PODE SER USO CONTÍNUO.</p>	<p>Indicações: Alívio de dores articulares moderadas e lombalgia aguda.</p> <p>Ação: Anti-inflamatória em osteoartrite, gota e outras condições inflamatórias.</p> <p>Contraindicações: Pacientes com úlceras gástricas e duodenais, cálculos e obstruções de vias biliares, intestino irritável, gravidez, lactação, usuários de anticoagulante oral e antiarrítmicos.</p> <p>Precauções: Deve ser administrado com cautela a pacientes com afecções cardiovasculares.</p> <p>Uso: 1 cápsula 1 a 2 vezes ao dia (em idosos diminuir a quantidade de vezes).</p> <p><i>*Uso restrito a duas semanas de utilização.</i></p> <p><i>*É contraindicado para menores de 18 anos.</i></p> <p><i>*É contraindicado na gravidez e lactação.</i></p>

<p>Ginkgo biloba ext. Seco 24% (<i>Ginkgo biloba</i> L.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p><i>Ginkgo biloba</i> L. ext. seco.....40mg Excipienteq.s.p.</p> <p><i>Ginkgo biloba</i> L. ext. seco.....80mg Excipienteq.s.p.</p> <p><i>Ginkgo biloba</i> L. ext. seco.....120mg Excipienteq.s.p.</p>	<p>Indicação: Para distúrbios circulatórios, arteriais decorrentes da má irrigação cerebral, como vertigens, perda de memória, dificuldade de concentração, elimina zumbidos no ouvido, trata labirintite e possui propriedades anti-radicaís livres.</p> <p>Ação: Preventiva e curativa contra as agressões endógenas/exógenas, tais como fenômeno de oxidação devido a presença de radicaís livres, age na prevenção do envelhecimento. A nível cerebral permite a diminuição das desordens da memória, distúrbios de atenção, diminuição da capacidade auditiva, casos de vertigem, preservando por mais tempo autonomia e qualidade de vida.</p> <p>Uso: 1 cápsula 2 vezes ao dia.</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p>
<p>Isoflavona extrato seco 40% (<i>Glycine max</i> L. Merr)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p>Isoflavona (<i>Glycine max</i> L. Merr).....40mg Excipienteq.s.p.</p> <p>Isoflavona (<i>Glycine max</i> L. Merr).....60mg Excipienteq.s.p.</p> <p>Isoflavona (<i>Glycine max</i> L. Merr).....75mg Excipienteq.s.p.</p> <p>*NOVA FÓRMULA</p> <p>Isoflavona (<i>Glycine max</i> L. Merr).....150mg Excipienteq.s.p.</p> <p>*NOVA FÓRMULA</p>	<p>Indicação: Repositor natural de hormônios na menopausa, a isoflavona evita o desconforto dos calores e excesso de irritação.</p> <p>Ação: Cardioprotetora e melhora a absorção do cálcio.</p> <p>Uso: Tomar 1-2 cápsulas ao dia.</p>
<p>Unha-de-gato extrato seco (<i>Uncaria tomentosa</i> D.C.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p> <p>NOVO</p>	<p>Unha-de-gato ext. seco (<i>Uncaria tomentosa</i> D.C.).....100mg Excipiente fito.....q.s.p.</p> <p>*Uso restrito a oito (8) semanas.</p> <p>*NÃO PODE SER USO CONTÍNUO.</p>	<p>Indicações: Anti-inflamatório, anti-reumático.</p> <p>Contraindicações: Potencialização da ação de anticoagulantes, aumentando o risco de hemorragias. Pacientes que serão submetidos a transplante, devido a seu efeito imunoestimulante, não devem fazer uso deste fitoterápico.</p> <p>Uso: 1 cápsula, 2 a 3 vezes ao dia.</p> <p>*Utilizar por, no máximo, oito semanas.</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p>
<p>Valeriana ext. seco (<i>Valeriana officinalis</i> L.)</p> <p>FITOTERÁPICO</p> <p>MANIPULADO</p>	<p><i>Valeriana officinalis</i> ext. seco.....50mg Excipienteq.s.p.</p> <p><i>Valeriana officinalis</i> ext. Seco.....100mg Excipiente.....q.s.p.</p>	<p>Indicação: Em casos de tensão nervosa durante TPM, menopausa. Em síndromes motoras e espasmos musculares. Combate o stress excesso de agitação nervosa. Calmante do sistema nervoso.</p> <p>Ação: Sedativo e calmante.</p> <p>Uso: 1-2 cápsulas ao dia, ou a critério médico.</p> <p>*É contraindicado na gravidez e lactação.</p>

Composto Vegetal Calmante FITOTERÁPICO MANIPULADO	Maracujá ext. seco (<i>Passiflora edulis</i>).....100mg Mulungu ext. sec (<i>Erythrina mulungu</i>).....100mg <i>Valeriana officinalis</i> ext. Seco.....100mg	Indicado: Composto contém ervas que favorecem a indução natural do sono. Trata a insônia e reduz o stress nervoso e a ansiedade. Ação: Calmante. Uso: 1-2 cápsulas 2x ao dia. *É contraindicado na gravidez e lactação.
Composto Vegetal Anti-Varizes FITOTERÁPICO MANIPULADO	Castanha índia ext. seco (<i>Aesculus hippocastanum</i>).....100mg Rutina pó.....100mg <i>Ginkgo biloba</i> L. ext. Seco 24%.....80mg Excipiente.....q.s.p.	Indicado: Este composto contém ervas que ativam a circulação sanguínea e o retorno venoso, agindo também como vasoconstritor periférico. Modificam a permeabilidade capilar e diminuem a fragilidade dos vasos. Ação: Vasoconstritor periférico. Uso: 1-2 cápsulas 3x ao dia *É contraindicado na gravidez e lactação.
Xarope Expectorante FITOTERÁPICO MANIPULADO	Ácido cítrico anidro.....0,2% Agrião extrato fluído.....1% Tintura de própolis.....1% Guaco extrato fluído.....2% Bálsamo de Tolú.....2% Xarope simples.....q.s.p.100ml	Indicação: acalma a tosse prolongada, proporcionando alívio da congestão pulmonar e promovendo a expectoração. Uso: 5 ou 10 mL 2 a 3 vezes ao dia.

32.2 De uso odontológico

Nome	Fórmula	Indicação/Ação/ Uso
Enxaguatório bucal cicatrizante FITOTERÁPICO <u>Uso externo, não engolir.</u>	Camomila ext. glicólico.....4% Tintura própolis.....2% Sacarina.....0,1% Benzoato de sódio.....0,2% Hortelã pimenta essênc...0,2% Glicerina branca.....10% Água destilada.....q.s.p.250ml * Produto fitoterápico * Contém sabor e aroma	Indicação: Cicatrizante gengival em periodontites, gengivites, aftas e lesões microbiana na gengiva. Ação: cicatrizante Uso: fazer bochechos 3 vezes ao dia a critério médico ou odontológico. <u>Uso externo, não engolir.</u>
Clorexidina digluconato 0,12% solução <u>Uso externo, não engolir.</u>	Digluconatoclorexidina.0,12% Hortelã pimenta essên.....0,5% Metilparabeno.....0,18% Glicerina branca.....10% Água destilada.....q.s.p.250ml * Contém sabor e aroma	Nome comercial: Periogard / Asseptic Receituário: Livre Gestação: risco B Indicação: Limpeza Ação: Antisséptica Uso: bochechar 2-3 vezes ao dia a critério médico ou odontológico. <i>Obs.:Não beber ou comer por 2-3 horas após o uso.</i> <u>Uso externo, não engolir.</u>

Fluoreto de sódio <u>Uso externo, não engolir.</u>	Fluoreto de Sódio.....0,05% Metilparabeno.....0,1% Sacarina.....0,04% Glicerina branca.....3% Hortelã pimenta essên...0,15% Água destilada.....q.s.p.250ml * Contém sabor e aroma. Fluoreto de Sódio..0,2% Metilparabeno.....0,1% Sacarina.....0,04% Glicerina bi-destilada.....3% Hortelã pimenta essên...0,15% Água destilada...q.s.p.250ml * Contém sabor e aroma.	Indicação: Utilizado para bochechos diários após a escovação dental, para prevenção de cáries. Ação: Anticárie Uso: A critério do médico ou odontológico. Receituário: Livre Gestação: Não deve ser utilizado sem orientação médica ou odontológica; Lactação: Não recomendado. Grupo Farmacológico: Profilaxia anti-cárie. Contraindicações: Hipersensibilidade a fluoreto ou componentes da fórmula, crianças com menos de 6 anos, dieta pobre em sódio.... Interações medicamentosas: Associação de fluoreto e clorexidina a 0,12% na prevenção de cáries em grávidas. <u>Uso externo, não engolir.</u>
--	--	---

32.3 De uso externo

Nome	Fórmula	Indicação/Ação/ Uso
Creme anti-micótico	Cetoconazol.....2% Metabissulfito sódio....0,3% Propilenoglicol.....1,67% Creme não-iônico.....q.s.p.15g	Indicação: Micoses superficiais, candidíase cutânea, dermatofitoses. Ação: Antifúngica. Uso: Aplicar na área 2 x dia ou a critério médico
Creme lanette	Creme lanette.....q.s.p..50g	Indicação: Umectante. Ação: Hidratante. Uso: aplicar 2 - 3 x dia.
Creme Dor articular / muscular FITOTERÁPICO	Salicilato de metila2,5% Vaselina sólida.....28% Lanolina anidra.....12% Cânfora1,5% BHT.....0,05% Camomila ext glicólico....10% Creme lanette.....q.s.p.50g	Indicação: Dor articular e/ou muscular. Ação: Analgésico e relaxante muscular. Uso: Aplicar na pele íntegra 2-3 x ao dia.
Creme Ureia 10%	Ureia10% Creme não-iônico.....q.s.p.50g	Indicação: Queratoplástico para pele ressecada. Ação: Hidratante. Uso: aplicar 2 - 3 x dia.
Creme ureia 10% + ácido salicílico 5%	Ureia10% Ácido salicílico5% Creme lanette.....q.s.p. 50g	Indicação: Queratolítico e hidratante. Ação: Hidratante. Uso: Aplicar nas rachaduras à noite e lavar pela manhã.

<p>Creme ureia 10% e óleo de amêndoas doce 10% (Creme uréia 10%+OAD 10%)</p>	<p>Ureia10% Óleo de amêndoas doce ...10% Creme lanetteq.s.p.50g</p>	<p>Indicação: Amaciar e retirar o ressecamento da pele. Ação: Hidratante. Uso: Aplicar diariamente nas áreas ressecadas 2-3 x dia.</p>
<p>Creme p/ fissura nos calcanhares</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Ureia10% Calêndula ext. glicólico.....5% Creme não-iônico.....q.s.p.60g</p>	<p>Indicação: Possui propriedades que podem deixar a pele hidratada por mais tempo e melhorar a cicatrização. Ação: Hidratante e cicatrizante. Uso: Diariamente 2-3 x dia</p>
<p>Creme cicatrizante de feridas</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Confrey ext. glicólico.....5% Óleo de girassol.....5% TCM (Triglicérides cadeia média).....10% Creme não-iônico.....q.s.p.50g</p>	<p>Indicação: Auxiliar no restabelecimento da pele de todo o corpo e na prevenção de escaras. Ação: Cicatrizante. Uso: Utilizar após a limpeza da pele.</p>
<p>Creme p/ picada de insetos</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p><i>Aloe vera</i> ext. glicólico.....5% Óleo de andiroba.....5% Creme lanette.....q.s.p.15g</p>	<p>Indicação: aliviar a coceira causada pela picada de insetos Ação: alívio de coceiras Uso: aplicar sempre que necessário</p>
<p>Creme prevenção de assaduras</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Camomila extr Glicólico ..5% Óleo de amêndoas doce...3% Óxido de zinco10% Glicerina bi-distilada.....10% Creme não-iônicoq.s.p.60g</p>	<p>Indicação: Para dermatite amoniacal. Ação: Hidratante, emoliente e protetor. Uso: Aplicar pequena quantidade na área afetada 3 x ao dia ou a cada troca de fraldas.</p>
<p>Creme prevenção de estrias</p>	<p>Óleo de amêndoas doce...10% Creme não-iônico....q.s.p. 60g</p>	<p>Indicação: Preventivo de estrias na gravidez, região do abdômen e nádegas. Ação: Hidratante. Uso: Massagear após o banho 2 x ao dia.</p>
<p>Creme com camomila 5%</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Camomila extr glicólico.....5% Creme lanetteq.s.p. 50g</p>	<p>Indicação: promove a cicatrização da pele e alívio da inflamação, para miliária e outras reações alérgicas cutâneas. Ação: Calmante e refrescante externo. Uso: Aplicar pequena quantidade na região afetada 2-3 x dia, diminuindo as aplicações progressivamente.</p>
<p>Creme de Papaína</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Papaína.....2%*;5%*;10%* Creme não-iônico...q.s.p.120g</p> <p>*a concentração de papaína deve ser requerida a critério do prescriptor em receituário, (2%; 5%; 10%)</p>	<p>Indicação: Debridante de feridas, hidratante e facilitador de cicatrização em ulcerações e feridas onde há tecido necrosado seco. Ação: Cicatrizante. Uso: Aplicação na ferida a cada troca de curativo. OBS.: Não deve ser entregue aos pacientes para uso domiciliar.</p>

<p>Gel Anti-Pruriginoso</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Mentol.....0,2%</p> <p>Cânfora0,5%</p> <p>Propilenoglicol.....5%</p> <p>Camomila extr glicólico....5%</p> <p>Gel base carbopol...q.s.p.100g</p>	<p>Indicação: Processos inflamatórios e pruriginosos.</p> <p>Ação: Calmante e refrescante externo.</p> <p>Uso: Aplicar 2 a 3 x ao dia sobre as lesões.</p>
<p>Gel de Arnica e Diclofenaco</p> <p>(Analgésico/anti-inflamatório)</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Arnica extrato glicólico....10%</p> <p>Diclofenaco sódico.....1%</p> <p>Salicilato de metila.....0,1%</p> <p>Mentol.....1%</p> <p>Cânfora1%</p> <p>Gel base carbopol...q.s.p.60g</p>	<p>Indicação: Contusões, traumas musculares, dores musculares.</p> <p>Ação: Anti-inflamatório local, analgésico e relaxante muscular.</p> <p>Uso: Aplicar na pele íntegra 2 a 3 x ao dia.</p>
<p>Gel de Arnica e Calêndula</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Arnica extr glicólico.....10%</p> <p>Calêndula extr glicólico....5%</p> <p>Gel base.....q.s.p.60g</p>	<p>Indicação: Para hematomas, traumas musculares, entorses, distensões e contusões.</p> <p>Ação: Analgésico, anti-inflamatório local e cicatrizante.</p> <p>Uso: Aplicar na pele íntegra por no máximo 7 dias.</p>
<p>Gel com Camomila</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Camomila extr glicólico....5%</p> <p>Gel base carbopol...q.s.p. 60g</p>	<p>Indicação: Propriedades anti-inflamatórias, promove cicatrização da pele e alívio da inflamação. Para queimaduras de 2º e 3º grau, dermatite alérgica e queimaduras solares.</p> <p>Ação: Calmante e cicatrizante externo.</p> <p>Uso: aplicar na área afetada 2 a 3 x ao dia.</p>
<p>Gel cicatrizante com Aloe vera e própolis</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p><i>Aloe vera</i> extr. glicólico....5%</p> <p>Própolis tintura.....2%</p> <p>Gel base carbopol...q.s.p.60g</p>	<p>Indicação: Para peles sensíveis e no tratamento da acne e comedões.</p> <p>Ação: Antisséptica e anti-inflamatório natural e cicatrizante, a Aloe vera têm propriedade umidificante, cicatrizante e condicionadora da pele, junto com o própolis promovem a cicatrização e impedem a inflamação cutânea.</p> <p>Uso: aplicar no local limpo 2 a 3 x dia.</p>
<p>Gel de Papaína</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Papaína2% * a 12%*</p> <p>Gel Base.....q.s.p. 120G</p> <p>** Concentração de papaína deve ser requerida a critério do prescriptor em receituário. (2%; 3%; 5%; 10% a 12%)</p>	<p>Indicação: Debridante de feridas e facilitador da cicatrização. Em ulcerações e feridas onde há tecido necrosado úmido.</p> <p>Ação: Cicatrizante.</p> <p>Uso: Aplicação na ferida a cada troca diária de curativo.</p> <p>OBS.: Não deve ser entregue aos pacientes para uso domiciliar.</p>
<p>Gel para Úlceras Varicosas</p> <p>FITOTERÁPICO</p>	<p>Centella asiatica extr. glic..5%</p> <p>Hamamélis extr. glic.....5%</p> <p>Castanha índia extr. Glic...3%</p> <p>Gel base carbopol..q.s.p. 120G</p>	<p>Indicação: Para úlceras varicosas, varizes e flebites.</p> <p>Ação: Cicatrizante.</p> <p>Uso: Aplicação 2 a 3 x dia.</p>

Loção mentol e cânfora	Mentol.....0,3% Cânfora.....0,3% Loção lanette.....q.s.p. 100g	Indicação: Proporciona sensação de frescor e alívio em queimaduras solares e em casos de picadas de insetos, promove alívio imediato da dor e da coceira. Ação: Hidratante e refrescante. Uso: Aplicar na pele limpa quantas vezes necessário.
Loção escabicida	Benzoato de benzila15% Loção lanette.....q.s.p.100g	Indicação: Escabiose e pediculose. Ação: Parasiticida. Uso: Aplicar a noite após o banho, do pescoço para baixo, esperar secar no corpo e tomar banho no outro dia de manhã.
Loção lanette	Loção lanetteq.s.p 120g	Indicação: Umectante. Ação: Hidratante. Uso: Aplicar 2 -3 vezes dia ou a critério médico.
Loção repelente de insetos FITOTERÁPICO	Óleo de citronela.....2% Óleo de andiroba.....5% Loção lanette.....q.s.p 100g	Indicação: É indicada para proteger a pele contra picadas de insetos. Ação: Repelente contra insetos. Uso: Aplicar a loção sobre a pele limpa, espalhando-a sobre toda a área que precisa de proteção. Obs.: Recomendação acima de 2 anos e não recomendado para grávidas.
Loção suavizante de Aloe vera e Camomila FITOTERÁPICO	Aloe vera ext. glicólico.....3% Camomila extr. glicólico....5% Loção lanetteq.s.p. 100mL	Indicação: Para hidratação da pele delicada, dermatoses alérgicas, miliária e queimaduras solares. Ação: Hidratante e refrescante. Uso: Aplicar 2 a 3 x dia, apenas em pele íntegra.
Óleo Regenerador FITOTERÁPICO	Óleo de girassol.....5% BHT0,1% Óleo germe de trigo.....5% TCM (Triglicérides cadeia média)50% Vaselina líquida.....40%	Indicação: Auxilia no restabelecimento da integridade da pele de todo o corpo e na prevenção da formação de escaras. Ação: Cicatrizante. Uso: Utilizar após a limpeza da pele 2 a 3 x dia.
Pasta D`água	Óxido de zinco.....25% Talco farmacêutico.....25% Glicerina bi-destilada.....25% Água destilada.....q.s.p. 80g	Indicação: Queimadura do sol e irritação cutânea. Também usado em catapora. Ação: Protetor, secante e calmante. Uso: aplicar na área afetada 2 a 3 vezes dia.
Solução para escaras e úlceras FITOTERÁPICO	Confrei ext. glic.....5% Aloe vera ext. glic.....5% Metilparabeno.....0,1% Água destilada....q.s.p. 100mL	Indicação: indicado para cicatrização e analgesia de escaras e úlceras na pele. Ação: Cicatrizante e analgésico. Uso: Aplicar na forma de compressas úmidas durante 30 minutos, 2 a 3 x dia.
Vaselina salicilada 1% , 2% e 5%	Ácido salicílico.....1% Vaselina líquida.....0,3% Vaselina sólida.....q.s.p.50g Ácido salicílico..... .2% Vaselina líquida.....0,3% Vaselina sólida.....q.s.p.50g Ácido salicílico.....5% Vaselina líquida.....0,3% Vaselina sólida.....q.s.p.50g	Indicação: Queratoses e hiperqueratoses. Ação: Queratolítica. Uso: Aplicar 1 vez dia ou a critério médico.

Xampu anti-seborreico	Cetoconazol.....2% Metabissulfito sódio.....0,1% Xampu base.....q.s.p.100mL	Indicação: Dermatite seborreica, caspa, dermatofitose. Ação: Antifúngico, anticaspa. Uso: Aplicar no couro cabeludo 2 a 3 vezes por semana ou a critério médico.
Xampu escabicida	Benzoato de benzila.....15% Xampu base.....q.s.p 100g	Indicação: Escabiose e pediculose. Ação: Escabicida. Uso: Aplicar no couro cabeludo com leve fricção, deixar as áreas atingida ensaboadas durante alguns minutos e enxaguar. Após enxaguar, usar pente fino para a remoção de lêndeas. Usar 2 a 3 por semana. Obs.: é irritante para a pele (ardência)

33. MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS UBS E ESF

33.1 Padronização de diluições e materiais ambulatoriais

Nome	Via Adm.	Composição/ Concentração	Apresenta ção	Uso/Diluição	Material / Classe Terapêutica
Adrenalina/(epinefrina) 1mg/ml	Nebulização	Hemitartarato epinefrina 1,82mg (eq. 1mg epinefrina base)	Amp c/ 1ml	C.P.M.	Nebulizador
Adrenalina/(epinefrina) 1mg/ml	IM	"	Amp c/ 1ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha25x7
Adrenalina/(epinefrina) 1mg/ml	IV	"	Amp c/ 1ml	C.P.M.	C.P.M.
Adrenalina/(epinefrina) 1mg/ml	SC	"	Amp c/ 1ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha25x7
Água Oxigenada 10 volumes	TÓPICA	Peróxido de Hidrogênio 3%	Fr. c/ 1000 ml	Tópico	Antisséptico
Álcool 70 % MANIPULADO	TÓPICA	Álcool 70° GL	Fr. c/ 1000 ml	Externo	Desinfecção
Aminofilina 240mg/10ml	IV (nunca IV direto nem IM)	Aminofilina 24mg/ml/10ml	Amp C/ 10ml	Soro fisiológico 0,9% 100 a 125ml	Seringa 10ml + Agulha 40x12+Escalpe+ Equipo

Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI	IM	Pó p/ Suspensão Injetável 600.000 UI	Frasco- ampola p/ 5ml	CRIANÇAS : 2ml Água destilada ADULTOS: 4ml Água destilada	Seringa 5ml +Agulha 40X12 p/ diluição + Agulha25X8 p/ aplicação
Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI	IM	Pó p/ Suspensão Injetável 1.200.000UI	Frasco- ampola p/ 5ml	4ml Água destilada	Seringa 5ml + Agulha 40X12 p/ diluição + Agulha 25X8 p/ aplicação.
Benzilpenicilina Benzatina +Potássica 400.000 UI	IM	Pó p/ Suspensão Injetável 300.000+100.000 UI	Frasco- ampola p/ 5ml	4ml Água destilada	Seringa 5ml + Agulha 40X12 p/ diluição + Agulha 25X8 p/ aplicação.
Ceftriaxona 500mg NOVO	IM	Pó p/ suspensão injetável IM	1 frasco- ampola- pó+1 ampola lidocaína 1% c/2ml	Pó+ diluente	Administração profuna IM
Ceftriaxona 1G NOVO	IM	Pó p/ suspensão injetável IM	1 frasco- ampola- pó+1 ampola lidocaína 1% c/3,5ml	Pó+ diluente	Administração profuna IM
Cianocobalamina 500mg/ml (1000MG) NOVO	IM	Vitmina B12 500mg/ml	Ampola de 2ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha25x7
Cimetidina 300mg/2ml	IV	Cimetidina 150mg/ml c/ 2ml	Amp. C/ 2 ml	20ml água destilada	Seringa20ml +agulha40x12 +Escalpe
Cimetidina 300mg/2m	IM	Cimetidina 150mg/ml c/ 2ml	Amp. C/ 2 ml	Sem diluição	Seringa 3ml +agulha 25x7
Clorexidina 0,2% solução aquosa uso farmacêutico externo c/ 1000ml	Tópico	Clorexidina 0,2% solução aquosa c/ 1000ml	Litro	Uso externo tópico	Antisséptico (usado em mucosas)
Clorexidina 0,5% solução alcoólica uso farmacêutico externo c/ 1000ml	Tópico	Clorexidina 0,5% solução alcoólica c/ 1000ml	Litro	Uso externo tópico	Atisséptico (usado em pele íntegra)
Colagenase c/ cloranfenicol	Tópica	Colagenase 0,6 u/g + cloranfenicol 0,01 g/g c/ 30 g	Bisnaga c/30 g	USO TÓPICO	Antimicrobiano

Dexametasona 2mg/ml	IV	Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml c/1ml	Amp. c/1ml	10 ml água destilada	Seringa 10ml + agulha 40x12+Escalpe
Dexametasona 2mg/ml	IM	Fosf. Dissódico Dexametasona 2mg/ml c/1ml	Amp. c/1ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha 25x7
Dexametasona 4mg/ml c/ 2,5ml	IV	Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml c/2,5ml	Amp. c/2,5ml	20 ml água destilada	Seringa 20ml + agulha 40x12+Escalpe
Diazepam Injetável	IV	Solução injetável 10mg/2ml - IM/IV	Ampola c/2ml	Sem diluição	Seringa 3ml +agulha 25x7 aplicação lenta.
Diazepam Injetável	IM	Solução injetável 10mg/2ml - IM/IV	Ampola c/2ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha 25x7
Diclofenaco Sódico 75mg/3ml	IM	Diclofenaco sódico 25mg/ml c/3ml	Ampola c/3ml	Sem diluição	Seringa 3ml +agulha25x7
Dipirona Sódica 1g	IV	Dipirona sódica 500mg/ml c/ 2ml	Ampola C/ 2ml	10ml água destilada	Seringa 10ml + Agulha 40x12 + Escalpe
Dipirona Sódica 1g	IM	Dipirona sódica 500mg/ml c/ 2ml	Ampola C/ 2ml	Sem diluição	Seringa 3ml + Agulha 25x7
Furosemida 20mg	IV	Furosemida 10mg/ml c/ 2ml	Ampola c/2ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha 25x7 (administração lenta)
Furosemida 20mg	IM	Furosemida 10mg/ml c/ 2ml	Ampola c/2ml	Sem diluição	Seringa 3ml +agulha25x7
Glicose 50%	EV	Glicose 50%	Ampola c/10ml	Sem diluição	C.P.M.
Hidrocortisona 100mg	IV	Succinato sódico de hidrocortisona 100mg pó líófilo	Frasco-ampola	10 ml Água Destilada	Seringa10ml + Agulha40X12 +Escalpe
Hidrocortisona 100mg	IM	Succinato sódico de hidrocortisona 100mg pó líófilo	Frasco-ampola	5ml Água destilada	Seringa 5ml + Agulha 40X12 + Agulha 25X7
Hidrocortisona 500mg	IV	Succinato sódico de hidrocortisona 500mg pó líófilo	Frasco-ampola	10 ml Água Destilada	Seringa10ml + Agulha 40X12 diluição+Escalp
Hidrocortisona 500mg	IM	Succinato sódico de hidrocortisona 500mg pó líófilo	Frasco-ampola	5ml Água destilada	Seringa 5ml + Agulha 40X12 Agulha 25X7

Lidocaína gel	Tópica	Lidocaína cloridrato 100mg/5g (geléia tópica 2%)	Bisnaga c/30g	Externo	Anestésico
LIDOCAÍNA cloridrato 2% c/ 20ml SEM vasoconstrictor (p/ procedimento)	C.P.M.	Lidocaína cloridrato 2% (20mg/ml)	Frasco c/20 ml	uso restrito médico(a)	Seringa +Agulha
LIDOCAÍNA cloridrato 2% c/ 20ml COM vasoconstrictor (p/ procedimento)	C.P.M.	Lidocaína cloridrato 2% c/ Epinefrina C/ 20ml	Frasco c/20 ml	uso restrito médico(a)	Seringa +Agulha
LIDOCAÍNA cloridrato 2% , tubetes SEM vasoconstrictor anestésico odontológico	C.P.O.	Lidocaína cloridrato 2% (20mg/ml) TUBETES	Caixa c/ 50 Carpule de 1,8ml	uso restrito médico/ dentista	Seringa de Carpule
LIDOCAÍNA cloridrato 2% tubetes COM vasoconstrictor anestésico odontológico	C.P.O.	Lidocaína cloridrato 2% + Fenilefrina 0,0004g TUBETES	Caixa c/ 50 Carpule de 1,8ml (Novocol)	uso restrito médico/ dentista	Seringa de Carpule
Metoclopramida 10mg/2ml	IV	Metoclopramida cloridrato 10mg/2ml	Ampola c/2m	Soro fisiológico 0,9% 100ml	Seringa 3ml + agulha 40x12+ Escalpe+Equipo
Metoclopramida 10mg/2ml	IM	Metoclopramida cloridrato 10mg/2ml	Ampola c/2ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha 25x7
Prometazina 50mg/2ml	IM	Prometazina cloridrato 25mg/ml c/2ml	Ampola c/2ml	Sem diluição	Seringa 3ml + agulha 25x7
Prometazina 50mg/2ml	IV	Prometazina cloridrato 25mg/ml c/2ml	Ampola c/2ml	10 ml Água Destilada	Seringa 10ml + agulha 40X12+ Escalpe (administração lenta)
Soro Fisiológico 0,9% c/ 100 A 125ml SISTEMA FECHADO <i>(Frasco tipo bolsa)</i>	EV / TÓPICA	Cloreto de sódio 0,9% SISTEMA FECHADO(bolsa)	Frasco c/ 100 ml	Uso interno / externo	Diluição para administração de medicamento EV ou IV (Medicamento Eletrolítico Endovenoso, para curativos e nebulização).
Soro Fisiológico 0,9% c/250ml SISTEMA FECHADO <i>(Frasco tipo bolsa)</i>	EV / TÓPICA	Cloreto de sódio 0,9% SISTEMA FECHADO (bolsa)	Frasco c/ 250ml	Uso interno / externo	Diluição para administração de medicamento EV ou IV (Medicamento Eletrolítico Endovenoso, para curativos e nebulização).

Soro Fisiológico 0,9% c/500ml SISTEMA FECHADO (<i>Frasco tipo bolsa</i>)	EV / TÓPICA	Cloreto de sódio 0,9% SISTEMA FECHADO (bolsa)	Frasco c/ 500 ml	Uso interno / externo	Diluição para administração de medicamento EV ou IV (Medicamento Eletrolítico Endovenoso, para curativos e nebulização).
Soro Fisiológico 0,9% c/1000ml SISTEMA FECHADO (<i>Frasco tipo bolsa</i>)	EV / TÓPICA	Cloreto de sódio 0,9% SISTEMA FECHADO (tipo bolsa)	Frasco c/ 1000 ml	Uso interno / externo	Diluição para administração de medicamento EV ou IV (Medicamento Eletrolítico Endovenoso, para curativos e nebulização).
Soro Fisiológico 0,9% c/100 a 125ml SISTEMA ABERTO- (<i>Frasco c/tampa rosca</i>)	TÓPICA e Nebulização	Cloreto de sódio 0,9% SISTEMA ABERTO	Frasco c/ 100ml TAMPA ROSCA	EXTERNO e Nebulização.	Para curativos e nebulização.
Soro Fisiológico 0,9% c/ 240ml SISTEMA ABERTO- (<i>Frasco c/tampa rosca</i>)	TÓPICA e Nebulização	Cloreto de sódio 0,9% SISTEMA ABERTO	Frasco c/ 240ml TAMPA ROSCA	EXTERNO e Nebulização.	Para curativos e nebulização.
Tintura de Benjoin	TÓPICA	Benjoin <i>Sumatra</i> Solução ácoolica a 20%	Frasco c/1000 ml	USO EXTERNO adulto e pediátrico C.O.M.	Em pele íntegra, Antisséptico, usar c/ auxílio de algodão, gaze ou espátula, para higienização e fixação de curativos
Vaselina líquida	TÓPICA	Óleo Mineral (Uso Externo)	Frasco c/1000 ml	USO EXTERNO, adulto e pediátrico.	Emoliente p/ pele, remoção de crostas, pomadas, pastas e outros, p/ limpeza e lubrificação da pele.

OBS.: Agulha 40x12 - utilizada somente para aspiração e diluição de medicamentos, **NUNCA** para aplicação em paciente.

Furosemida EV – aplicação lenta 04mg por minuto (01 ampola em 05 minutos).

LEGENDA:

CPM- Conforme Prescrição Médica;

CPO-Conforme Prescrição Odontológica.

REFERÊNCIAS

- <http://www.saude.rs.gov.br/lista/153/Componentes>) Visto em 21/08/2015;
- BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Formulário Terapêutico Nacional 2008: Rename 2006/Ministério da Saúde**. Brasília : Ministério da Saúde 2008. (Série B. Textos Básicos de Saúde).
- FERREIRA, Oliveira Anderson. **Guia Prático da Farmácia Magistral**. Volume 1, 3ª edição, São Paulo: Pharmabooks, 2008.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde**, – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 1135 p. : il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
- BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Assistência Farmacêutica na atenção básica: Instruções técnicas para sua organização / Ministério da saúde**.– 2 ed. - Brasília : Ministério da Saúde 2006. 100p: il. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
- BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME 2014. Ministério da saúde**.– 9 ed. - Brasília : Ministério da Saúde 2015. 228p.
- SANTOS, Luciana dos, TORRIANI, Mayde Seadi, BARROS, Elvino. **Medicamentos na prática da farmácia clínica/ Organizadores**. Porto Alegre: Artmed, 2013.
- BRASIL. **Memento Fitoterápico da Farmacopéia Brasileira**. 1ª edição. Brasília: Anvisa, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : RENAME 2017 / Ministério da Saúde**, – Brasília : Ministério da Saúde, 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : RENAME 2018 [recurso eletrônico]/Ministério da Saúde**, – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.
- BRASIL. Lei Federal nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 21 dez. 1973.
- BRASIL. Lei Federal nº. 9.787 de 10 de fevereiro de 1999. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 11 fev. 1999. Disponível em: . Brasil. Acesso em: 01 jul. 2002.
- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (Brasil). Resolução 357, de 20 de abril de 2001. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília. Acesso em 22/09/2015.
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução CFM nº 1.246/88. Dispõe sobre o Código de Ética Médica. Brasília: CFM, 1988. Disponível em: . Acesso em 22/09/2015.

ÍNDICE RESMISSIVO

A

Acetazolamida	48
Aciclovir	26
Ácido acetil salicílico.....	11, 19
Ácido fólico.....	46
Albendazol.....	27
Alcachofra extrato seco (<i>Cynara scolymus</i> L.).....	16, 40, 51
Alendronato de Sódio 70mg.....	46
Alopurinol.....	16
Aminofilina.....	13
Amiodarona cloridrato.....	38
Amitriptilina cloridrato (Tricíclicos).....	29
Amoxicilina.....	20
Amoxicilina + clavulanato de potássio.....	20
Ampicilina.....	20
Anlodipino besilato.....	34
Atenolol.....	35
Azitromicina.....	24

B

Beclometasona, dipropionato	12, 15
Benzilpenicilina benzatina.....	20
Benzilpenicilina procaína+potássica.....	21
Benzoato de benzila.....	27
Biperideno cloridrato (anticolinérgico de ação central).....	33
Budesonida.....	15

C

Captopril.....	37
Carbamazepina.....	30
Carbonato cálcio+Vit. D (500+D400).....	46
Carbonato de cálcio.....	46
Carbonato de cálcio Elementar	46
Carbonato de lítio.....	31
Carvedilol.....	36
Cáscara sagrada ext. seco (<i>Rhamnus purshiana</i> D.C.).....	41, 51
Cefalexina.....	21
Ceftriaxona dissódica IM	21
Cetoconazol.....	25
Cianocobalamina (vitamina B12).....	47
Ciprofloxacino.....	22
Clindamicina cloridrato.....	22
Clomipramina, cloridrato.....	29
Clonazepan.....	33
Cloranfenicol.....	24
Cloreto de sódio + Benzalcônio.....	15
Clorexidina digluconato 0,12% solução.....	53
Clorpromazina.....	31
Composto Vegetal Anti-Varizes.....	41, 53
Composto Vegetal Calmante.....	33, 53
Creme anti-micótico.....	54
Creme cicatrizante de feridas.....	55
Creme com camomila 5%.....	55
Creme de Papaína.....	55
Creme Dor articular / muscular.....	48, 54
Creme lanette.....	54
Creme p/ fissura nos calcanhares.....	55
Creme p/ picada de insetos.....	55

Creme prevenção de assaduras	55
Creme prevenção de estrias	55
Creme Ureia 10%	54
Creme ureia 10% + ácido salicílico 5%	54
Creme ureia 10% e óleo de amêndoas doce 10%	55

D

Dexametasona	12
Dexclorfeniramina	18
Diafragma	50
Diazepam (benzodiazepínico)	33
Digoxina	40
Dipirona monoidratada	11
Dispositivo intra-uterino plástico c/ cobre	50
Doxiciclina cloridrato	25

E

Enalapril	38
Enantato de noretisterona+valerato de estradiol (IM)	45
Enxaguatório bucal cicatrizante	53
Eritromicina estolato	24
Escopolamina butilbrometo de (Hioscina)	18
Espinheira santa extrato seco (<i>Maytenus ilicifolia</i>)	16, 51
Espironolactona	39
Estriol Creme (uso vaginal)	43
Estrogênios conjugados naturais	44
Etinilestradiol + levonorgestrel	44

F

Fenitoína sódica	30
Fenobarbital (Barbitúrico)	30
Fenoterol, Bromidrato de	14
Fitas (tiras reagentes) p/ HGT	49
Fluconazol	26
Fluoreto de sódio	28, 54
Fluoxetina cloridrato	29
Furosemida	39

G

Garra-do-diabo extrato seco (<i>Harpagophytum procumbens</i> D.C.)	11, 51
Gel Anti-Pruriginoso	56
Gel cicatrizante com Aloe vera e própolis	56
Gel com Camomila	56
Gel de Arnica e Calêndula	48, 56
Gel de Arnica e Diclofenaco	48, 56
Gel de Papaína	56
Gel para Úlceras Varicosas	56
Gentamicina, sulfato 0,5%	22
Ginkgo biloba ext. Seco 24% (<i>Ginkgo biloba</i> L.)	41, 52
Glibenclamida	42
Gliclazida	42
Glicosímetro digital	49

H

Haloperidol (neuroléptico)	32
Hidralazina	36
Hidroclorotiazida	39
Hidróxido de alumínio	17

Hidróxido de alumínio 6% + Magnésio 4%	17
Hipromelose 0,5%	48

I

Ibuprofeno.....	11
Imipramina	29
Insulina Humana NPH 100 (N)	43
Insulina Regular Humana (R)	43
Ipratrópio, Brometo de.....	14
Isoflavona extrato seco 40% (<i>Glycine max</i> L. Merr).....	44, 52
Isossorbida Dinitrato 10mg	37
Isossorbida Dinitrato 5mg	36
Isossorbida mononitrato	37
Itraconazol.....	26
Ivermectina	27

L

Lancetas.....	49
Levodopa+Benzerazida (dopaminérgicos)	34
Levodopa+Carbidopa.....	34
Levomepromazina	32
Levonorgestrel	45
Levotiroxina sódica	42
Loção escabicida.....	57
Loção lanette	57
Loção mentol e cânfora	57
Loção repelente de insetos.....	57
Loção suavizante de Aloe vera e Camomila.....	57
Loratadina.....	19
Losartana	38

M

Mebendazol.....	27
Medroxiprogesterona acetato (IM)	45
Medroxiprogesterona acetato	44
Metformina cloridrato.....	43
Metildopa	37
Metoclopramida	18
Metoprolol Succinato	35
Metoprolol tartarato	35
Metronidazol / Benzoilmetronidazol	24
Miconazol	26

N

Neomicina sulfato+bacitracina zíncica	22
Nifedipina	34
Nistatina	26
Nitrofurantoína.....	23
Noretisterona	45
Nortriptilina cloridrato	30

O

Óleo Mineral.....	41
Óleo Regenerador	57
Omeprazol	17
Ondasentrona, cloridrato	18
Oseltamivir (Tamiflu)	27

P

Paracetamol.....	12
Pasta D`água.....	57
Permanganato de potássio.....	28
Permetrina.....	28
Piridoxina cloridrato (Vitamina B6).....	47
Pirimetamina.....	28
Prednisolona, fosfato sódico de.....	13
Prednisona.....	13
Preservativos femininos.....	50
Preservativos masculinos.....	50
Prometazina 25mg.....	19
Propafenona.....	39
Propranolol cloridrato.....	36

R

Ranitidina.....	17
Risperidona.....	32

S

Sais para reidratação oral.....	47
Salbutamol.....	14
Seringas para insulina 50CC c/agulha.....	49
Sinvastatina.....	40
Solução de Thiersch.....	28
Solução para escaras e úlceras.....	57
Sulfadiazina.....	23
Sulfadiazina de prata Creme	23
Sulfametoxazol+ Trimetoprima.....	23
Sulfato ferroso (Fe²⁺).....	47

T

Tetraciclina cloridrato.....	25
Tiamina (vitamina B1).....	48
Timolol, maleato 0,5%.....	49
Tioridazina (neuroléptico).....	32

U

Unha-de-gato extrato seco (<i>Uncaria tomentosa</i> D.C.).....	12, 52
---	--------

V

Valeriana ext. seco (<i>Valeriana officinalis</i> L.).....	33, 52
Valproato de sódio ou Ácido Valproico.....	31
Varfarina Sódica.....	19
Vaselina salicilada.....	57
Verapamil.....	35
Vitamina A+D (Palmitato de Retinol).....	47

X

Xampu anti-seborreico.....	58
Xampu escabicida.....	58
Xarope Expectoante.....	13, 53